SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CHI CỤC THỦY SẢN, CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1324 /CCTSCNTY-NTTS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2026

V/v tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Xây dựng và Môi trường/Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường các xã/phường các xã, phường, đặc khu có hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản;
- Ban Quản lý Rừng và Khuyến nông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, hiện nay (06/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm ngày 08/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới thành phố Hải Phòng. Từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh, từ đêm 09 trời chuyển rét; để đảm bảo an toàn cho sản xuất nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại, bất lợi, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Xây dựng và Môi trường/Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường các xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý rừng và Khuyến nông quan tâm một số nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Xây dựng và Môi trường/Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường các xã, phường, đặc khu

1.1. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chức năng thực hiện tốt nội dung Công văn số 1185/SNNMT-CCTSCNTY ngày 30/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn mùa vụ nuôi, trồng thủy sản năm 2026; Công văn số 23/CCTSCNTY-NTTS ngày 06/01/2026 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y về việc chủ động ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại trong nuôi trồng thủy sản.

1.2. Chủ động trong công tác điều tiết các nguồn cấp, thoát nước thải cho hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi tập trung trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, kịp thời khi cần thay, bổ sung cho vùng nuôi.

1.3. Tăng cường kiểm tra, phân công cán bộ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn ứng phó trong giai đoạn chuyển mùa, phòng chống rét cho thủy sản nuôi; tăng cường thông tin tới người nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, ương

dưỡng giống về diễn biến thời tiết, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ giảm sâu, thay đổi nhiệt độ lớn, có thể rét đậm, rét hại kéo dài… (qua hệ thống thông tin đại chúng, bản tin trên loa, đài phát thanh ...), đảm bảo sản xuất cung cấp đủ thực phẩm cho thị trường các tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, nguyên, nhiên vật liệu, dụng cụ cần thiết để chủ động phòng, tránh khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra.

- Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá chuối, cá rô đồng, ếch, baba, cá vược, cá chim vây vàng…, chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra thiệt hại thủy sản nuôi bị chết do rét.

- Trong suốt thời gian rét đậm, rét hại, không dùng lưới, các loại phương tiện thu tỉa để bắt cá, tránh cá bị xây sát dẫn đến bị nhiễm bệnh các bệnh như đốm đỏ, lở loét da do nấm, trùng quả dưa, ký sinh trùng… gây ra.

Trường hợp ao đầm có thủy sản nuôi bị chết không rõ nguyên nhân phải thu gom tập trung, xử lý và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý; không đưa thủy sản chết, thải nước ao đầm chưa xử lý ra môi trường ngoài.

- Tuyệt đối không sử dụng các loại phân gia súc, gia cầm tươi bón trực tiếp xuống ao, đây là con đường truyền nhiễm bệnh giun sán, liên cầu khuẩn… và là ký chủ trung gian ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Đối với đàn thủy sản nuôi lưu giữ qua đông nên chọn tại những ao đáp ứng điều kiện ở nơi khuất gió, có cây cối hoặc nhà che chắn. Nếu ao ở hướng gió thì nên đào ao sâu ở hướng Bắc để làm nơi cho cá trú ngụ trong mùa rét; có nhà bạt phục vụ lưu giữ qua đông.

- Hạn chế thả giống trong mùa đông; chỉ tổ chức thả giống đối với các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho động vật thủy sản.

- Chăm sóc, quản lý ao nuôi:

* Luôn luôn giữ mực nước tối thiểu từ 1,5 - 2,0 m. Mặt ao thả bèo tây, khoảng 2/3 diện tích ao được ngăn lại tránh tản đều khắp ao hoặc trồng chuối theo hàng về phía Bắc, che chắn bằng vật liệu thích hợp để chắn gió.

* Làm sọt tránh rét: Tạo một góc ao sâu về phía Bắc, dùng các sọt đan bằng tre lấy rơm rạ dùng nước vôi phun vào sát trùng, phơi thật khô ấn đầy vào sọt, cắm cọc đơm sọt xuống đáy ao. Sau 10 - 15 ngày thấy rơm rạ đã bị phân hủy thì vớt lên tránh gây ô nhiễm môi trường ao nuôi.

* Đối với những ao nuôi có diện tích nhỏ, bể nuôi lưu giữ cá thì làm giàn trên mặt ao, bể và che phủ bằng bạt nilon để tăng khả năng giữ nhiệt độ.

* Giữ môi trường nước trong ao ổn định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ sâu, pH, hàm lượng oxy, màu nước…; những ngày mù trời, lặng gió cần tăng cường quạt nước, sục khí, sử dụng viên bổ sung oxy để tránh thiếu oxy và hiện tượng phân tầng nước. Định kỳ 2 lần/tháng sát khuẩn môi trường nước bằng nước vôi trong té (tạt) xuống ao với hàm lượng 1 - 2 kg/100m^2 hoặc các sản phẩm khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất; khi thấy nước ao bị ô nhiễm, nên sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường làm sạch nước cho ao nuôi như EM, BKC, VICATO…

* Khi nhiệt độ từ 14^{0}C trở lên, tranh thủ cho cá ăn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung thêm vitamin C, B.complex vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho cá với lượng dùng từ 3 - 5g/kg thức ăn. Với thức ăn công nghiệp nên chọn loại cám có hàm lượng đạm cao từ 28% trở lên để giúp cá hồi phục sức khỏe sau thời gian chống rét. Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18^{0}C, nên giảm 1/2 lượng thức ăn cho cá ăn. Khi nhiệt độ nước xuống thấp dưới 14^{0}C cần ngừng cho cá ăn.

* Dọn sạch cỏ, rác trong ao và thức ăn thừa ở nơi cho cá ăn. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có hướng xử lý kịp thời khi có thay đổi bất thường xảy ra.

- Chăm sóc, quản lý lồng bè nuôi trên sông:

* Di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả sâu lồng nuôi 1,8-2,0 m.

* Treo túi vôi hoặc hóa chất khử trùng ở đầu dòng chảy để khử trùng nước, phòng bệnh cho thủy sản nuôi lồng bè trên sông; định kỳ vệ sinh 1 lần/1 tuần lồng, bè nuôi nhằm loại bỏ rác và các vật cứng bám vào lồng, bè nuôi.

* Bổ sung vitamin B1, C... vào khẩu phần ăn với lượng 3-5g/kg thức ăn để nâng cao sức khỏe đàn cá nuôi trong lồng.

- Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chủ động sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; theo dõi, chăm sóc đàn bố mẹ để chủ động sinh sản, cung ứng nguồn giống thủy sản phục vụ sản xuất các tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

2. Đề nghị Ban Quản lý rừng và Khuyến nông tăng cường phối hợp với các địa phương kịp thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông ngư dân về các biện pháp kỹ thuật chủ động ứng phó, phòng chống rét đậm, rét hại phù hợp với đối tượng, điều kiện nuôi trong hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Xây dựng và Môi trường/Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường các xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý rừng và Khuyến nông quan tâm, triển khai thực hiện; thường xuyên cập nhật tình hình và thông tin về Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y để phối hợp chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các xã/phường/đặc khu;
- Sở NN&MT (*để B/c*);
- CCT, các PCCT;
- Lưu: VT, NTTS.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CHI CỤC THỦY SẢN, CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG T.P HẢI PHÒNG

Đỗ Đức Thịnh