

Số: /UBND-KT, HT&ĐT
V/v tập trung phòng trừ sinh vật
gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ
Đông Xuân 2025-2026

Ái Quốc, ngày tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp;
- Tổ Trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thời gian qua, thời tiết trên địa bàn phường nắng mưa xen kẽ, nhiều ngày có mưa, thuận lợi cho các trà lúa vụ Đông Xuân sinh trưởng phát triển; cây lúa chủ yếu đang ở giai đoạn làm đòng - trổ bông - chín. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày tới, thời tiết có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông; đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật phát sinh phát triển gây hại lúa; đặc biệt, bệnh đạo ôn gây hại cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân bướm 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng....

Thực hiện Công văn số 456/CCTTBVTV-NV, ngày 05/5/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tập trung phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ Đông Xuân 2025-2026; Hướng dẫn số 14/HD-TTTVNT ngày 06/5/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thanh về hướng dẫn các biện pháp, kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sinh vật gây hại lúa vụ Xuân 2026.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây ra bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025-2026. UBND phường đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Giám đốc các HTXDVNN; Trưởng các Tổ dân phố, tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông

Phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh như nếp, TBR225, ĐàiThom 8, BC15,... trong điều kiện trời mát, có mưa, ẩm độ không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao. Thời điểm phun trừ lần 1 khi lúa thấp tho trổ, phun lại lần hai khi lúa trổ thoát hoàn toàn. ...Có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hàm lượng cao hoạt chất *Tricyclazole*, *Isoprothiolane*, *Fenoxanil*... một số loại thuốc như: Bump650WP, Filia 525SE, Bump gold 40WP, Bankan 600WP, Ninja 35EC, Fuji-One 40EC, Kabim 30WP, Kasoto 200 SC, Bamy 75WP, Kata 2SL, Fu-Army 30WG...

2. Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 3

Chỉ phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa chưa trổ có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên; trên những diện tích có mật độ hàng trăm con/m² phải phun kép lần 2 sau lần phun 1 từ 4 - 5 ngày.

Thời gian phun trừ: từ ngày 07/5/2026 - 15/5/2026 đối với diện tích lúa trở sau ngày 10/05/2026 (tùy từng vùng sinh thái, theo địa bàn và sinh trưởng của lúa khi Trạm có Thông báo, Hướng dẫn cụ thể). Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng cao hoạt chất: Isocycloseram, Indoxacarb hoặc hỗn hợp Indoxacarb với Emamectin benzoate, hỗn hợp Indoxacarb với Chlorfenapyr... Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Incipio200 SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 150SC, Ammate 150 EC, Obaone 95WG...

3. Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa chưa trở, chỉ đạo nông dân phun trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ trứng/m² trở lên. Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Voliamtargo 063SC, Prevathon 200SC, Padan 95SP, Gà nòi 95SP, Chlorferan 240SC, ... để phòng trừ sâu đục thân 2 chấm

4. Phòng trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt

- Bệnh khô vằn: Phun trừ bệnh khô vằn trên những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số danh trở lên.

- Bệnh lem lép hạt: Phun phòng chống bệnh khi thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao; phun thuốc khi lúa thấp tho trở.

- Có thể sử dụng các loại thuốc như: Tilt super 300 EC, Amistar Top 325 SC, Camilo 150 SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5SC.... để phòng trừ bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt.

- **Rầy:** Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng, thời gian tháng 5-7/2026 nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn TBNN, có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt trong tháng 5/2026; trong khoảng thời gian này có 5-6 đợt nắng nóng, có 2-3 đợt nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 37°C) và có ngày đặc biệt gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 39°C). Do vậy, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến đối tượng rầy gây hại lúa cuối vụ Đông Xuân, phân loại tỷ lệ rầy lưng trắng - rầy nâu để phân tích nguy cơ, dự báo bệnh lùn sọc đen gây hại lúa vụ Mùa 2026 phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo kịp thời hiệu quả. Chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn nông dân kiểm tra những diện tích lúa sau trở bông, phát hiện và phun trừ kịp thời khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (40 - 50con/khóm) trở lên (giai đoạn lúa chưa trở phun trừ với mật độ 2.000 con/m² trở lên).

+ Đối với cây lúa ở giai đoạn lúa trở - ngâm sữa: nên sử dụng thuốc BVTV có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Titan 600WG, Pexena 20WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...

+ Đối với cây lúa ở giai đoạn chắc xanh – chín: nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Actara 25WG, Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Acnipyram 50WP... Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 0,8 - 1,0 m) phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả của thuốc.

5. Phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Bệnh bạc lá phát sinh phát triển và gây hại trên diện rộng trên các giống nhiễm (lúa lai...) giai đoạn cây lúa làm đòng - trổ bông, gây hại nặng sau các cơn mưa dông; nên tuyệt đối không bón phân đạm (Urê), hoặc phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng trên những ruộng lúa đã xuất hiện bệnh gây hại; có thể phun phòng bệnh cho các giống lúa nhiễm bằng một số loại thuốc như: Totan 200WP, Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Starner 20WP...

* Lưu ý:

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun;
- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; sau khi phun thuốc 3-4 giờ gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ; nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát; thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định.

6. Phòng trừ Chuột hại

Khuyến cáo nông dân tiếp tục diệt chuột đồng bộ các biện pháp, quan tâm diện tích lúa nằm xem kẹp giữa các công ty, liên kê gò đống, bãi rác, khu chuyển đổi, trong đó đẩy mạnh diệt chuột bằng biện pháp săn bắt, đặt bẫy, cạm... Tuyệt đối nghiêm cấm diệt chuột bằng điện dưới mọi hình thức.

Để làm tốt công tác phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ Đông xuân 2025-2026. UBND phường Ái Quốc đề nghị Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, Giám đốc các HTX Dịch vụ nông nghiệp, các ông (bà) tổ Trưởng tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường (để bc)
- Lưu: Phòng KT, HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thảo