

Số: /TB - BCĐ

Ái Quốc, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Thực hiện Thông báo số 08/TB-TTTVHD ngày 04/5/2026 của Trạm trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hải Dương về tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc thông báo tới các Tổ dân phố, trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các hộ nông dân chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh như sau:

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời mưa nắng xen kẽ, ảnh hưởng của một vài đợt không khí lạnh gây mưa rào và giông. Nhiệt độ trung bình 20-32⁰ C , ẩm độ không khí trung bình 70 - 80%.

2. Cây trồng:

- Lúa xuân: Trà xuân sớm đang chắc xanh, trà xuân muộn đang làm đòng đến thấp tho trở.
- Trên cây vải: Trà vải thiều sớm đang chín đến thu hoạch, giống vải thiều lai đầy cùi; Trà vải thiều chính vụ đang làm cùi.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH

1. Trên lúa xuân:

- Chuột: Gây hại cục bộ các trà lúa. Tỷ lệ danh bị hại trung bình 1-2%, nơi cao 7-10%. Diện tích bị hại khoảng 5ha.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành rải rác vũ hoá từ 28/4, vũ hoá rộ từ 30/4 trở đi. Mật độ trưởng thành trung bình 1 - 3 con/m², nơi cao 3 – 5con/m², có khu vực 15 –20con/m². Mật độ trứng trung bình 50 – 80 quả/m², nơi cao 120-150 quả/m², ở một số xã như Hà tây, Hà Bắc, - Bệnh đạo ôn: Lây lan gây hại cục bộ trên các giống nhiễm như (nếp, J02, TBR225,...). Tỷ lệ bệnh TB 4-7%, nơi cao 10-20%. Cấp bệnh C1- C5. Diện tích nhiễm 35ha chủ yếu ở phường Nam Đồng, xã Thanh Hà, xã Hà Bắc, xã Hà Tây.

- Ngoài ra còn sâu đục thân: Trưởng thành vũ hóa và đẻ trứng rải rác trên trà xuân trung, xuân muộn.

- Rầy nâu – Lùng trắng: Gây hại cục bộ một số giống nhiễm như TBR225, P6, ... Mật độ trung bình 100-180con/m² nơi cao 300-450con/m² có điểm 1.200-1.500con/m² đa số rầy tuổi 1 đến tuổi 3. Diện tích nhiễm khoảng 0,5ha, ... như ở xã Hà Bắc.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây hại cục bộ các giống nhiễm như TBR225, Đài Thơm 8, P6 ... Tỷ lệ lá bị bệnh trung bình 2-3%, nơi cao 8-10%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3. Diện tích nhiễm khoảng 4,8ha như ở P. Việt Hoà, P. NamĐông, xã Hà Bắc, ...

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa. Tỷ lệ danh bị hại trung bình 4-7%, nơi cao 10-18% cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5. Diện tích nhiễm trung bình khoảng 750ha.

Ngoài ra còn bọ xít, bệnh lem lép hạt, đốm nâu, hiện tượng vàng lá sinh lý, ...

2. Cây vãi:

- Sâu đục quả: Trưởng thành vũ hoá, đẻ trứng trên các trà vãi; Mật độ trưởng thành trung bình 0,5 -1 con/cành, nơi cao 2-3 con/cành.

- Rệp sáp, rệp vẩy: Gây hại cục bộ trên một số vườn phun trừ chưa tốt. Tỷ lệ hại trung bình 3-4%, nơi cao 7-8%, cấp hại từ cấp 1 đến cấp 2.

- Ngoài ra còn bọ xít, bệnh thán thư, chàm quả...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa xuân:

- Chuột: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà lúa;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục đẻ trứng, sâu non lúa 3 nở từ 5/5 trở đi gây hại lá đồng trà xuân muộn, nếu không phun trừ tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Sâu đục thân: Sâu non nở gây bông bạc diện tích lúa xuân muộn trễ sau 5/5.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám tiếp tục nở tích lũy mật độ gây hại các giống nhiễm.

- Bệnh đạo ôn: Khi gặp điều kiện mưa nhỏ, trời se lạnh, ẩm ướt... bệnh phát sinh gây hại cổ bông các giống nhiễm.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm.

- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trổ gặp mưa bệnh phát sinh gây hại hạt trà xuân muộn.

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa

2. Cây vãi:

- Sâu đục quả: Sâu non nở gây hại quả các trà vãi từ ngày 08/5 trở đi nếu không được kiểm tra phun trừ kịp thời;

- Rệp sáp, rệp vẩy: tiếp tục gây hại cục bộ.

- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh, lây lan gây hại quả các trà vãi.

- Ngoài ra còn Bọ xít, bệnh chàm quả...gây hại rải rác.

* Để hạn chế thiệt hại do sâu, bệnh gây ra. Ban Chỉ đạo; Trung tâm Dịch vụ công phối hợp với các Tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân kiểm tra phòng trừ các đối tượng dịch hại như sau:

- Tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch 137/KH-SNNMT

ngày 03/12/2025 về diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Các hộ nông tích cực đánh bắt chuột bằng các biện pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp đặt cạm bẫy, hun khói, Không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục để diệt chuột. Cấm tuyệt đối việc sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột theo Công văn 3785/SNNMTCCTTBVTV ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

1. Cây lúa:

- Điều tiết nước hợp lý để cây lúa trở bông, làm hạt được thuận lợi.
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr, như thuốc Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC,... phun từ ngày 07 đến 11/5/2026 cho diện tích lúa xuân muộn chưa trở bông khi phát hiện mật độ sâu từ 20con/m² trở lên, sau phun từ 5 -7 ngày kiểm tra lại nếu thấy mật độ sâu non còn cao (> 20con/m²) phun lại để bảo vệ lá đòng.
- Đối với sâu đục thân: Các hộ nông dân chú ý thăm đồng kiểm tra, nếu mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m² trở lên dùng một trong các thuốc đặc hiệu như: Sunset 150SC hoặc Prevathon 200SC, Voliam -Targo 063SC, ... phun trừ cho các diện tích lúa trở sau 5/5/2026.
- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa khi phát hiện có mật độ rầy từ 25 - 30con/khóm, giữ nước ở ruộng từ 3 – 5 cm và dùng một số loại thuốc như: Chess 50WG, Apta 300WP, Sutin 5EC, Dantotsu 50WSG, ... phun trừ và phun thật kỹ từ 20 – 24 lít nước thuốc cho 1sào.
- Đối với bệnh đạo ôn: dùng một trong các loại thuốc như: Filia 525SE, Katana 20SC, Bankan 600WP, ...phun phòng cho các giống nhiễm khi lúa thấp tho trở.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Dùng thuốc Lobo 8WP; Starner 20WP; Ychatot 900SP; Kasumin2L; ... phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc phun phòng trước hoặc sau các đợt mưa giông đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng hầu đặc biệt những ruộng đã bị nhiễm bệnh.
- Đối với bệnh khô vằn: Dùng thuốc Tilt super 300EC; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng trừ.
- Bệnh lem lép hạt: Dùng thuốc Tilt super 300EC; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng khi lúa thấp tho trở.

2. Cây vải áp dụng đối với trà vải thiều lai, trà vải thiều chính vụ: :

- Đối với sâu đục cuống quả: Dùng một số loại thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole, Emamectin benzoate, ...; Phun từ ngày 08 đến 12/5/2026 cho trà vải thiều lai khi báo mã, trà vải thiều chính vụ khi gần đầy cùi.
- Rệp sáp, rệp vẩy: Dùng thuốc có hoạt chất như: Spirotetramat, ... phun trừ khi tỷ lệ quả bị nhiễm trên 5%.
- Đối với bọ xít: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy xuất hiện bọ xít non 1con/cành.

- Bệnh thán thư, chàm quả: Dùng thuốc có hoạt chất như Azoxystrobin như Amistar 250SC, Majestic 250SC, hoặc thuốc Orande 280SC, ... phun phòng trừ khi thấy bệnh chớm xuất hiện.

(Chú ý: - Phun xong sau 3-4 tiếng gặp mưa phải phun lại, khi lúa trổ phải phun vào buổi chiều mát, luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu;

- Không hỗn hợp nhiều loại thuốc, phân bón lá để phun cho cây vải, nên phun vào chiều mát tránh gây cháy mã quả. Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày đảm bảo thời gian cách ly;

- Bà con cần mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc, sau khi phun cần thu gom vỏ bao bì về đúng nơi quy định của địa phương).

Trên đây là thông báo về việc tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc đề nghị Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, các tổ dân phố, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền tới các hộ nông dân để chủ động bảo vệ sản xuất Nông nghiệp./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường;
- Các HTX DVNN;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT; KT, HT&ĐT.(Đ/c Huyện)

**TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO SXNN**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thảo**