

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2026

HƯỚNG DẪN

Một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ Ốc bươu vàng (OBV) hại lúa

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị bước vào gieo cấy vụ mùa năm 2026. Tuy nhiên, từ giai đoạn gieo, cấy đến khi cây lúa bén rễ, hồi xanh - đẻ nhánh, đây là giai đoạn ốc bươu vàng gây hại mạnh nhất. OBV là loại phàm ăn, ăn khỏe và ăn cả ngày lẫn đêm, nhưng thích ăn nhất là lá non và lá bánh tẻ. Trên ruộng lúa, chúng thường ăn từng đám, cắt đứt thân lúa. Nếu không được phòng trừ kịp thời ốc gây hại làm khuyết mật độ ảnh hưởng lớn đến năng suất. Cần lưu ý trên những diện tích lúa cấy mạ non và lúa gieo thẳng ở những chân ruộng trũng nước.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Biện pháp thủ công:

- Bắt ốc và thu gom ổ trứng bằng tay: Nên bắt ốc sớm và liên tục, bắt lúc sáng sớm hoặc chiều mát;

- Đặt lưới mắt cáo bằng kim loại, bằng lưới nilon hay bằng tre nứa ở chỗ dẫn nước để ngăn chặn ốc lây lan, đồng thời cũng dễ thu gom;

- Vét rãnh trên ruộng để khi tháo nước, rút nước trong ruộng nhằm tập trung ốc ở rãnh để bắt hoặc phun thuốc;

- Phát động chiến dịch tiêu diệt OBV trên địa bàn, bắt ốc và thu gom ổ trứng đem tiêu hủy;

- Điều tiết chế độ nước bằng cách rút nước định kỳ, giữ mực nước thấp 2 - 3cm nhằm hạn chế ốc di chuyển, phá hại.

2. Biện pháp dẫn dụ sinh học: Dùng một số loại thức ăn ưa thích như: dây lá khoai lang, lá khoai sọ, lá đu đủ, lá chuối, sơ mít bó thành mớ thả xuống ruộng dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến bám xung quanh rồi thu bắt;

Dựa vào đặc tính ẩn nấp ban ngày của OBV, cắt cỏ xanh đem đắp thành mô nhỏ khắp ruộng. Chiều mát thu gom ốc bươu vàng tiêu hủy, làm liên tục trong nhiều ngày;

Khi OBV sinh sản có thể cắm nhiều cọc dọc theo bờ ruộng để thu hút ốc đến đẻ trứng và diệt trừ các ổ trứng.

3. Biện pháp hóa học:

Tiến hành phòng trừ khi mật độ ốc bươu vàng từ trên 3 con/m² trở lên bằng một số loại thuốc: Black Carp 750 WP, Clodansuper 700WP, Dioto 830WG, Amani 70WP, Transit 750WP, VT-dax 700WP, Tomahawk 4GR...

- Với lúa sạ: Trước khi sạ vài ngày, bà con dẫn nước xâm xấp vào ruộng để như ốc bươu vàng trôi lên. Sau đó tiến hành phun thuốc rồi mới sạ lúa. Phun một

trong các loại thuốc hóa học trừ ốc bươu vàng cho lúa với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì thuốc;

- Với lúa cấy: Trước khi cấy hoặc ngay sau khi cấy tháo cạn xâm xấp nước phun thuốc diệt ốc cho lúa, sau 24 giờ phun thuốc mới cho thêm nước để cấy hay dưỡng lúa;

Đồng thời cần lưu ý sau khi phun (rải) thuốc phải giữ mực nước trong ruộng từ 3-5 cm trong thời gian từ 5-7 ngày; Không để nước thuốc rò rỉ xuống khu vực nuôi trồng thủy sản. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hay chiều mát là lúc ốc bươu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng hiệu quả của thuốc.

Chú ý: các loại thuốc trừ ốc thường có độ độc cao ảnh hưởng trực tiếp đến các động vật thủy sinh và nguồn nước sinh hoạt vì vậy cần ưu tiên sử dụng biện pháp thủ công để phòng trừ ốc, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV Hải Phòng; (thay BC);
- Phòng KT/ Phòng KT, HT & ĐT;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- HTXDVNN;
- Lưu Trạm TT&BVTV.

TRẠM TRƯỞNG



Phạm Văn Cường