

Số: 14 /HD-TT&BVTV

Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2026

HƯỚNG DẪN
Một số biện pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục sản xuất trồng trọt
cho cây trồng sau bão số 4/2026

Hiện nay, các trà lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng - trổ bông; cây rau màu chủ yếu là ngô, mướp, bầu, bí, ớt, cà chua, rau gia vị, rau ăn lá, ... đang ở giai đoạn từ cây con - thu hoạch; các loại cây ăn quả như: Vải, Quýt, Ổi, Chuối và một số loại hoa cây cảnh ... sinh trưởng phát triển.

Từ ngày 21/8/2026 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 khu vực Hải Phòng có mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng nếu không được tiêu thoát nước kịp thời, bên cạnh đó mưa ngập nước và dông lốc kèm theo tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại cây trồng.

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ngập úng đến cây trồng, Trạm Trồng trọt và BVTV Hải Dương hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật khắc phục sau mưa bão cho sản xuất trồng trọt cụ thể:

1. Đối với cây lúa vụ Mùa:

- Rút nước khẩn cấp: Vận hành tối đa máy bơm tiêu, khơi thông toàn bộ hệ thống kênh mương thoát để rút nước nhanh ra khỏi ruộng. Không để lúa bị ngập ngộp kéo dài gây thối rễ, thối đòng, ảnh hưởng sinh trưởng phát triển của cây lúa;

- Chăm sóc và bón phân: Dùng bón phân hóa học (đặc biệt là phân Đạm) khi bộ rễ chưa hồi phục. Phun các loại phân bón lá vi lượng, chế phẩm kích thích ra rễ như K.Humic, KH, siêu lân, Atonik 1.8 SL..., để hệ thống rễ và cây phục hồi nhanh.

2. Đối với các loại cây màu vụ Hè Thu:

- Khẩn trương thu hoạch ngay những diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch để tránh thối hỏng, giảm giá trị thương phẩm.

- Khơi thông mương rãnh, chủ động bơm, tháo nước nhanh, kịp thời, đảm bảo không để nước cao ngập luống gây thối cây, thối rễ cây rau màu. Dùng vòi bơm nước sạch phun nhẹ rửa sạch bùn đất bám trên lá để cây kịp thời quang hợp. Cắt tỉa bỏ lá vàng lá úa, lá thối, cành gãy, tiến hành xới xáo phá váng kết hợp vun gốc, chăm sóc kịp thời cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi

- Dập cây bị chết, nâng cây bị đổ ngã, cắm giàn, buộc thân, nhánh kịp thời đối với cây họ dây leo, tay leo.

Có thể kết hợp phun bổ sung hợp chất sinh học *Amino 6 DD- ND*, hoặc các loại phân bón lá như: *K. Humic, ET, siêu lân, ...* giúp cây kích rễ, phục hồi sinh trưởng.

- Đối với những diện tích cây rau màu bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng phục hồi cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất để gieo trồng lại bằng những cây rau ngắn ngày, cây trồng thích hợp để tăng hệ số sử dụng đất và cung cấp rau cho thị trường lúc giáp vụ.

3. Đối với cây ăn quả:

- Khẩn trương tiêu thoát nước cho vườn cây.

Khẩn trương khơi thông rãnh thoát nước, đào bổ sung rãnh hoặc sử dụng máy bơm để đưa nước ra khỏi vườn nhanh nhất có thể. Không để nước tiếp tục ứ đọng quanh vùng rễ cây.

- Vệ sinh vườn và làm đất sau khi nước rút.

Khi nước đã rút, cần thu gom rác, lá cây, quả rụng, cành gãy, dập đem đi tiêu hủy để cây tập trung dinh dưỡng, hạn chế môi trường nấm bệnh phát triển.

Khi đất đã se mặt, tiến hành xới nhẹ, phá váng lớp đất mặt quanh vùng tán cây, giúp đất thông thoáng và cung cấp oxy cho bộ rễ. Chỉ xới nông, tránh làm đứt rễ tơ đang bị tổn thương.

- Sử dụng vôi hợp lý để cải thiện môi trường đất.

Sau khi đất đã thoát nước, có thể sử dụng vôi nông nghiệp với lượng phù hợp để cải thiện môi trường đất, giảm độ chua và hạn chế nguồn bệnh trong đất. Không nên bón vôi với lượng quá cao hoặc bón tập trung sát gốc.

- Chủ động phòng trừ nấm bệnh sau ngập úng

Cần thường xuyên kiểm tra vườn và phun các loại thuốc phòng nấm, khuẩn sau mưa bão như: *Mataxyl 500WP, Ridomil Gold 68WG, Oxyclozox*... để phòng trừ các bệnh vàng lá, thối rễ, nứt thân, sùi mủ...

- Bổ sung dinh dưỡng qua lá đối với cây đang nuôi quả

Trong thời gian đầu sau ngập úng, khi bộ rễ còn yếu, tuyệt đối không bón phân hóa học, đặc biệt là phân đạm và các loại phân có nồng độ cao, vì có thể gây áp lực cho bộ rễ đang bị tổn thương.

Đối với những vườn ổi đang trong giai đoạn nuôi quả, trong khi bộ rễ còn bị tổn thương và khả năng hấp thu dinh dưỡng qua đất chưa phục hồi hoàn toàn, có thể sử dụng phân bón qua lá *K. Humic, KH, ET, Atonik 1.8 SL, siêu lân...* giúp cây nhanh phục hồi. Có thể ưu tiên các sản phẩm cung cấp dinh dưỡng trung, vi lượng

như canxi, bo, kẽm và các chất dinh dưỡng cần thiết khác, sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên phun phân bón lá khi thời tiết quá nắng nóng, khi lá còn ướt do mưa hoặc khi cây đang có biểu hiện héo nặng.

- Phục hồi bộ rễ khi đất đã thông thoáng

Khi đất đã thoát nước hoàn toàn và tương đối khô thoáng, có thể sử dụng các chế phẩm hỗ trợ phục hồi bộ rễ như axit humic, axit fulvic hoặc các chế phẩm sinh học phù hợp như chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* để bảo vệ và phục hồi bộ rễ. Khi kiểm tra thấy cây bắt đầu hồi phục, xuất hiện rễ tơ mới, chồi mới và lá mới phát triển bình thường, từng bước bổ sung dinh dưỡng.

Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật phục hồi và chăm sóc cho cây lúa, rau màu và cây ăn quả sau mưa bão đề nghị đề nghị Phòng Kinh tế xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn phối hợp chỉ đạo, truyền truyền để nông dân biết và thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV Hải Phòng; (thay BC);
- Phòng KT/ Phòng KT, HT & ĐT;
- Phòng xây dựng nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- HTXDVNN;
- Lưu Trạm TT&BVTV.



Phạm Văn Cường