

Số:587 /TB-UBND

Ái Quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ rầy cuối vụ gây hại lúa vụ Mùa năm 2026

Hiện nay, trên địa bàn phường các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Trà mùa sớm: giai đoạn đổ đuôi - chín, chuẩn bị thu hoạch; trà mùa trung: trổ bông - phơi màu - chín sấp; trà mùa muộn: làm đòng.

*** Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng**

Kết quả kiểm tra của UBND phường đến ngày 22/9/2026, rầy nâu, rầy lưng trắng đã bắt đầu nở và gây hại trên các giống lúa Nếp, BC15, Đài thơm 8, TBR 225,... Mật độ rầy phổ biến 300 – 400 con/m², nơi cao 800 – 1.000 con/m², cá biệt có ổ rầy mật độ từ 2.000 - 3.000 con/m².

Trong những ngày tới, rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ tiếp tục nở rộ, tăng nhanh về mật độ và diện tích gây hại trên các giống lúa giai đoạn chắc xanh - đổ đuôi - chín; nếu không được kiểm tra, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời, đúng kỹ thuật sẽ có nhiều diện tích lúa bị “**cháy rầy**” gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất.

Để hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, bảo vệ an toàn năng suất lúa vụ Mùa năm 2026, UBND phường đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, các Tổ dân phố và các phòng, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc và tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: thường xuyên thăm đồng, điều tra, phát hiện sớm những ổ rầy có mật độ từ 1.000 con/m² trở lên đối với những diện tích lúa đã trổ; mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở lên đối với những diện tích lúa chưa trổ, hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao.

- Có thể sử dụng một trong những loại thuốc sau để phun trừ rầy:

+ Đối với lúa đang giai đoạn chắc xanh: sử dụng thuốc có tác dụng nội hấp - lưu dẫn như: Pexena 20WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Chatot 600WG, Cheestar 50WG, Oshin 20WP,...

+ Đối với lúa giai đoạn đổ đuôi - chín: sử dụng thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Acnipyram 50WP, Titan 600WG... Trước khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng, mỗi băng từ 4 - 6 hàng lúa, phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú.

Lưu ý:

- Liều lượng dùng theo hướng dẫn trên bao gói, phải phun đủ lượng nước, thuốc trên đơn vị diện tích

- Khi phun thuốc trừ rầy ruộng lúa phải có nước từ 3 - 5cm

- Sau khi phun thuốc 3-5 ngày phải kiểm tra lại nếu mật độ rầy còn cao phải phun lại lần 2.

- Trên những diện tích lúa giai đoạn chín có mật độ rầy cao có thể thu hoạch sớm

- “gặt chạy” (không nên phun thuốc) để đảm bảo an toàn nông sản.

* Để phun trừ rầy đạt hiệu quả cao: yêu cầu các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp bán đúng chủng loại thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

* Đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền để đợt phun trừ rầy cuối vụ đạt kết quả tốt, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026.

* Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Công an phường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân sản xuất trồng trọt ***ng nghiêm cấm việc sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức***, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trên đây là thông báo của UBND phường, đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các tổ dân phố, các phòng, đơn vị liên quan quan tâm triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTĐU phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Thành viên BCĐ SX nông nghiệp phường;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các HTX DVNN, các TDP;
- Lưu: VT; KT, HT&ĐT (đ/c Huyền).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thảo