

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 261/UBND-KT

An Phú, ngày 12 tháng 8 năm 2025

V/v hướng dẫn phòng trừ
sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 bảo vệ
sản xuất lúa vụ Mùa 2025

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 142/CCTTBVTN-VN ngày 06/08/2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2025.

Theo Thông báo số 03/TB-TTTVCL ngày 11/8/2025 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chí Linh về việc hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh hại lúa Mùa năm 2025.

Hiện nay các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt, trà Mùa sớm giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà Mùa trung đang đẻ nhánh rộ, trà mùa Muộn trung đang giai đoạn bén rễ hồi xanh- bắt đầu đẻ nhánh.

Về tình hình sinh vật gây hại cây trồng (sâu bệnh) trên lúa trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đã rải rác vũ hoá từ ngày 5/8/2025, vũ hoá rộ từ 8/8/2025. Dự báo, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 sẽ nở và gây hại từ ngày 15/8/2025 trở đi, trong đó, trên trà lúa Mùa sớm, Mùa trung sâu non nở tập trung từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2025; Dự tính, lúa sâu này có phạm vi gây hại rộng, mật độ trung bình khoảng 40 - 60 con/m², cục bộ có những diện tích mật độ có thể tới hàng trăm con/m². Rầy nâu, rầy lưng trắng cũng đang xuất hiện gây hại cục bộ, nhất là trên những diện tích cấy giống lúa TBR225, nếp, mật độ trung bình 500- 800 con/m². Ngoài ra, xuất hiện sâu đục thân, bệnh khô vằn gây hại cục bộ trên trà mùa sớm, bệnh nghệt rễ, trên trà mùa trung, mùa muộn.

Để hạn chế thiệt hại do sinh vật gây ra đối với sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, đồng thời hạn chế tình trạng nông dân phun thuốc tràn lan, không hiệu quả, ô nhiễm môi trường, UBND xã An Phú đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn, Trưởng các thôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 hại lúa vụ Mùa 2025 như sau:



I. KỸ THUẬT CHĂM BÓN:

1. Trà Mùa sớm: Tập trung bón đón đòng sớm khi cây lúa bước vào giai đoạn đứng cái phân hoá đòng các hộ nông dân bón với lượng phân 1kg đạm urê + 3-4kg kali/ sào.

2. Trà Mùa trung: Bón thúc với lượng phân 4 - 5kg NPK + 1 - 2 kg urê/ sào.

3. Trà Mùa muộn: Bón thúc với lượng phân: Đợt 1: 2 – 3kg urê hoặc 4 – 5 kg NPK; Đợt 2: 4 - 5kg NPK + 1 - 2 kg urê / sào.

Chú ý: Đối với diện tích lúa bị nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ: Tạm dừng bón phân vô cơ, đặc biệt là đạm urê, tiến hành thay nước trong ruộng; bón vôi bột để khử chua kết hợp phun phân bón qua lá giàu lân như Siêu lân, Com Cat, Tốt rễ giúp cây lúa nhanh phục hồi.

II. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

1. **Đối với chuột hại:** Các hộ nông tích cực đánh bắt chuột bằng các biện pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp đặt cạm bẫy, hun khói, không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài để diệt chuột. Tuyệt đối không diệt chuột bằng điện.

2. **Sâu cuốn lá nhỏ:** Dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr, như thuốc Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC, ... hỗn hợp với thuốc có hoạt chất Emamectin bezoate như thuốc E 100, ... để phun trừ, cụ thể:

+ **Trà mùa sớm, mùa trung :** Phun khi phát hiện mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2025.

+ **Trà Mùa muộn và mùa trung gieo cấy muộn:** Phun khi phát hiện mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2025.

+ Sau phun từ 4- 5 ngày, tiến hành kiểm tra nếu thấy mật độ sâu vẫn cao vượt ngưỡng 20 con/m² trở lên đối với trà Mùa sớm, mùa trung, 50 con/m² trở lên đối với trà lúa mùa muộn thì tiến hành phun lại lần 2.

3. **Rầy nâu, rầy lưng trắng:** Thường xuyên kiểm tra ruộng thấy mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở sử dụng các loại thuốc như: Chess 50WG, Vua rầy (ACDINOSIN 50WP), CHESE SUPER 35WG để phun trừ. Cần tăng cường chú ý trên các diện tích gieo cấy giống Bắc thơm số 7, Nếp, Trà Mùa muộn phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen để trừ môi giới truyền bệnh vì rút lùn sọc đen Phương Nam, bệnh vàng lùn lụi...

4. **Sâu đục thân:** Khi phát hiện thấy từ 5% đánh héo trên trà lúa Mùa sớm, 10% đánh héo đối với trà lúa Mùa trung, Mùa muộn trở lên thì sử dụng 1 kg thuốc Sattrungdan 5GR trộn đều với 4 kg cát khô rắc đều cho 1 sào, khi rắc ruộng phải có nước 3-5 cm và giữ nước ở ruộng 2 - 3 ngày.

5. **Đối với bệnh khô vằn:** Ruộng nào nhiễm bệnh khô vằn nên kết hợp thuốc để phun nhưng không thay đổi nồng độ và liều lượng nước thuốc. Trừ bệnh

khô vắn bằng các loại thuốc: Sai zol 5SC, Vắn sữa 5EC.

UBND xã yêu cầu các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Trường các thôn và Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh xã để các hộ nông dân nắm bắt, phòng trừ kịp thời hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT.



Nguyễn Đình Dũng

