

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHÚ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 355/UBND-KT

An Phú, ngày 2 tháng 8 năm 2025

V/v tăng cường phòng trừ
sâu bệnh gây hại trên lúa
Mùa 2025.

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 5510/SNNMT-CCTTBVTV ngày 19/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa Mùa 2025; Thông báo số 04/TB-TTTVCL ngày 21/8/2025 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chí Linh về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa năm 2025.

Hiện nay các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt, trà Mùa sớm giai đoạn đứng cái - làm đồng, trà Mùa trung đang cuối giai đoạn đẻ nhánh, trà mùa Muộn trung đang giai đoạn đẻ nhánh rộ.

Về tình hình sinh vật gây hại cây trồng (sâu bệnh) trên lúa trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đã rải rác vũ hoá từ ngày 5/8/2025, vũ hoá rộ từ 8/8/2025. Dự báo, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 sẽ nở và gây hại từ ngày 15/8/2025 trở đi, trong đó, trên trà lúa Mùa sớm, Mùa trung sâu non nở tập trung từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2025; Lúa sâu này có phạm vi gây hại rộng, mật độ trung bình khoảng 40 - 60 con/m², cục bộ có những diện tích mật độ có thể tới hàng trăm con/m². Rầy nâu, rầy lưng trắng cũng đang xuất hiện gây hại cục bộ, nhất là trên những diện tích cấy giống lúa BT7, TBR225, nếp, mật độ trung bình 500- 1.000 con/m². Ngoài ra, xuất hiện sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh thối thân gây hại trên các trà mùa sớm, mùa trung.

Để hạn chế thiệt hại do sinh vật gây ra đối với sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, thối thân trên lúa Mùa, UBND xã An Phú đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn, Trưởng các thôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh, chuột hại vụ Mùa 2025 như sau:

1. Kỹ thuật chăm bón

1.1. Trà Mùa trung: Tập trung bón đón đồng sớm khi cây lúa bước vào giai đoạn đứng cái phân hoá đồng các hộ nông dân bón với lượng phân 1kg đạm Urê



+ 3-4 kg kali/ sào.

2.2. Trà Mùa muộn: Bón thúc với lượng phân 4 - 5kg NPK + 1-2 kg Urê/ sào.

Chú ý: Đối với diện tích lúa bị bệnh thối thân, bạc lá vi khuẩn: Tạm dừng bón phân vô cơ, đặc biệt là đạm Urê, tiến hành thay nước trong ruộng; bón vôi bột tã để khử đất.

2. Phòng trừ sâu bệnh

2.1. Đối với chuột hại:

- Các hộ nông tích cực đánh bắt chuột bằng các biện pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp đặt cạm bẫy, hun khói, không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài để diệt chuột; tuyệt đối không diệt chuột bằng điện.

- Đối với các Hợp tác xã, các thôn ký hợp đồng đánh bắt diệt chuột với các công ty, tổ chức thực hiện theo hợp đồng.

2.2. Sâu cuốn lá nhỏ:

Dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr, như thuốc Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC, ... hỗn hợp với thuốc có hoạt chất Emamectin bezoate như thuốc E 100, ... để phun trừ, cụ thể:

+ **Trà mùa sớm, mùa trung:** Trên những diện tích lúa Mùa đã phun trừ (từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2025) nông dân kiểm tra thăm đồng phun trừ ngay khi mật độ sâu Cuốn lá nhỏ còn cao (từ 20 con/m² trở lên với lúa giai đoạn phân hóa đồng, từ 50 con/m² trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh).

+ **Trà Mùa muộn:** Phun khi phát hiện mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2025.

+ Sau phun từ 4- 5 ngày, tiến hành kiểm tra nếu thấy mật độ sâu vẫn cao vượt ngưỡng 50 con/m² trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh tiến hành phun lại lần 2.

2.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Thường xuyên kiểm tra ruộng thấy mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở lên trên những diện tích lúa đứng cái – làm đồng sử dụng các loại thuốc như: Chess 50WG, Vua rầy (ACDINOSIN 50WP), CHESE SUPER 35WG để phun trừ. Cần tăng cường chú ý trên các diện tích gieo cấy giống Bắc thom số 7, Nếp, Trà Mùa muộn phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen để trừ môi giới truyền bệnh vi rút lùn sọc đen Phương Nam, bệnh vàng lùn lụi...

2.4. Sâu đục thân: Khi phát hiện thấy từ 5% đánh héo trên trà lúa Trung, 10% đánh héo trở lên đối với trà lúa Mùa muộn lên thì sử dụng 1 kg thuốc Sattrungdan 5GR trộn đều với 4 kg cát khô rắc đều cho 1 sào, khi rắc ruộng phải có nước 3-5 cm và giữ nước ở ruộng 2 - 3 ngày.

2.5. Đối với bệnh khô vằn, thối thân, Bạc lá vi khuẩn: Ruộng nào nhiễm bệnh khô vằn, thối thân, bạc lá vi khuẩn nên kết hợp thuốc để phun nhưng không thay đổi nồng độ và liều lượng nước thuốc. Trừ bệnh khô vằn bằng các loại thuốc: Sai zol 5SC, Vằn sữa 5EC, Tilt Super 300EC. Bệnh thối thân, bạc lá vi khuẩn bằng thuốc đặc trị Phy San, Vi Sen 20SC.

3. Giao Phòng Kinh tế phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Trường các thôn và Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền thông xã thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền để các hộ nông dân nắm bắt, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa kịp thời hiệu quả./-

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Dũng

