

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC THANH MIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bắc Thanh Miện, ngày tháng 04 năm 2026

V/v tăng cường chỉ đạo phòng trừ
sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo
ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông
Xuân 2025-2026

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 08/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025- 2026.

Hiện nay, lúa Đông Xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt; trong đó trà sớm đang ở giai đoạn làm đòng; trà muộn cây lúa chủ yếu đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng. Tuy nhiên sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn đang có xu hướng phát sinh mạnh và lan rộng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia: Từ nay đến đầu tháng 5/2026 có thể sẽ xuất hiện mưa rào, có những ngày ẩm độ không khí cao, thời tiết nắng mưa xen kẽ, trời âm u. Đây là điều kiện thuận lợi để sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn (đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông) phát sinh phát triển, gây hại gia tăng trên đồng ruộng và gây hại trực tiếp bộ lá đòng; sẽ có diện tích bị lúa sâu cuốn lá nhỏ gây hại trắng lá, bệnh đạo ôn lá gây “lụi lúa” và bệnh đạo ôn cổ bông gây bông bạc ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phun phòng trừ, kịp thời, hiệu quả.

Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bắc Thanh Miện hướng dẫn về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2

Đã vũ hóa, đẻ trứng trên diện rộng:

- Mật độ trưởng thành phổ biến: 0,2-0,3 con/m², nơi cao 2-3 con/m².
- Mật độ trứng phổ biến: 30-50 quả/m², nơi cao 80-100 quả/m², cá biệt 150-200 quả/m².

- Dự kiến sâu non lúa 2 bắt đầu gây hại từ ngày 15-20/4/2026, sâu non nở và gây hại trên lúa già trước, lúa non sau, mật độ phổ biến 20-30 con/m², nơi cao 60-80 con/ m², cá biệt 150-200 con/m².

Phòng trừ:

- Chỉ phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 15 – 20/04/2026 trên trên những diện tích lúa làm đòng, những diện tích lúa Xuân muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh chưa phải phun.

- Phun đúng thời điểm sâu non tuổi nhỏ, đúng thuốc và đúng diện tích lúa cần phun. Áp dụng nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc - đúng liều - đúng lúc - đúng cách.

- Thuốc sử dụng trừ sâu cuốn lá nhỏ trong danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế cung ứng trên địa bàn, có thể lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng cao hoạt chất: Isocycloseram, Indoxacarb hoặc hỗn hợp Indoxacarb với Emamectin benzoate, hỗn hợp Indoxacarb với Chlorfenapyr... ví dụ như: Incipio 200 SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 150SC, Ammate 150 EC, Obaone 95WG,...

2. Bệnh đạo ôn

- Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện, gây hại trên những diện tích lúa nhiễm bệnh như: Nếp, BC 15, TBR 225, Đài thơm 8... cá biệt có nơi tỷ lệ bệnh từ 20 đến 30% số lá.

Phòng trừ:

- Kiểm tra và phun trừ bệnh trên những giống lúa nhiễm bệnh khi thấy bệnh xuất hiện với tỷ lệ 5-10% số lá trở lên bằng một số loại thuốc Filia 525SE, Bump 650WP, Kabum 650WP, Kasai-S 92SC, Katana 20SC, ...

- Bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié: tiến hành phun phòng chống bệnh trên giống nhiễm khi lúa thấp tho trở bằng một số loại thuốc đặc trị như: Filia 525SE, Beam 75WP, Fujione 40EC, Ninja 35EC...

3. Bệnh khô vằn

Cần tập trung theo dõi đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm vào giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

Phòng trừ:

Phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị khô vằn sau: Amistar Top 325SC (phun thuốc vào thời điểm lúa làm đòng); Nevo 330EC (phun thuốc khi thấy bệnh xuất hiện); Tilt super 300EC (phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 8%); Anvil 5 SC (phun khi thấy bệnh xuất hiện).

***Lưu ý:**

Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ chai, gói thuốc; khuyến cáo nông dân phun thuốc khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2); thời điểm phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát, phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ.

Trong thời gian phun sâu bệnh phải cung cấp đủ nước tại ruộng mới đạt hiệu quả phòng trừ sâu bệnh đặc biệt là phun trừ đục thân và rầy nâu.

Thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại khác như chuột phá hoại trong giai đoạn làm đồng - trở bông, bệnh lem lép hạt, rầy nâu - rầy lưng trắng... để tham mưu, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả khi đến ngưỡng; tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng, tuyên truyền nội dung hướng dẫn; Trưởng các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 đạt hiệu quả.

Trên đây là hướng dẫn tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 của UBND xã Bắc Thanh Miện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế hoạch sản xuất đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Chủ tịch, các phó CT UBND xã;
- Lưu: VT, KT (Thuận).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thuận