

Số: /TB-TTĐVSNC

Bình Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA XUÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-TTĐVCS ngày 16/3/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cẩm Bình về việc hướng dẫn chăm sóc cây lúa vụ Chiêm xuân 2026. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bình Giang Thông báo tình hình dịch hại trên lúa chiêm xuân và biện pháp phòng trừ, cụ thể như sau:

I- THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. **Thời tiết:** Từ ngày 26/3 – 22/3; Nhiệt độ TB 23⁰C cao 28⁰C; thấp 20⁰C. Ẩm độ trung bình: 65-80%; Trong tuần thời tiết có nắng nhẹ, đêm và sáng có nhiều sương.

2. **Cây trồng:** Trà xuân muộn: Đẻ nhánh. Một số diện tích đẻ nhánh rộng.

II- TÌNH HÌNH DỊCH HẠI

1. **Bệnh đạo ôn lá:** Tuần qua thời tiết đêm và sáng có nhiều sương, nhiệt độ thấp, các diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, lúa đang phát triển xanh tốt, đây là những điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn phát sinh và lây nhiễm trên đồng ruộng. Vết bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện rải rác trên các giống nhiễm như: Nếp 415, Nếp Đài Loan,.. đã xuất hiện trên địa bàn xã Bình Giang,.. Vết bệnh đạo ôn lá ban đầu có dạng chấm kim giọt dầu loang sau dần vết bệnh phát triển thành dạng hình thoi có viền màu nâu đỏ, ở giữa có màu nâu xám, xung quanh có quầng màu vàng nhạt. Khi lá lúa bị bệnh nặng, các vết bệnh liên kết với nhau gây cháy lá lúa, cây lúa bị lùn lụi, thân cây bị thối nhũn, bộ rễ thâm đen. Ở giai đoạn nhìn thấy vết bệnh đạo ôn lá điển hình thì bào tử nấm bệnh đạo ôn đã xâm nhập vào mô lá lúa từ 5-7 ngày.

2. **Bọ xít hại lúa:** Xuất hiện rải rác trên đồng ruộng. Mật độ trung bình 0,5-1 con/m², nơi cao 3-5 con/m², các diện tích có mật độ bọ xít cao đã được nông dân phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

3. **Chuột hại:** Tỷ lệ hại 0,05-0,1% dảnh, cao 2-3% dảnh, tập trung trên những ruộng gần gò đồng, chân đường mạ. Các xã, HTXĐVNN đã tích cực triển khai được 3-4 đợt diệt chuột ngay từ đầu vụ sản xuất theo sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, hạn chế đáng kể sự gây hại của chuột trên đồng ruộng.

Ngoài ra, các diện tích lúa sinh trưởng phát triển chậm, chân ruộng cao, ruộng thường xuyên bị mất nước,.. xuất hiện nhiều loại cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây lúa như: cỏ lồng vực, cỏ bông lau, cỏ chác, cỏ lác,...

III- DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI THỜI GIAN TỚI

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và lây nhiễm trên các giống nhiễm.
- Chuột hại rải rác trên các chân ruộng cao cạn nước, ruộng gần gò đồng.
- Bọ xít, ruồi đục nõn gây hại rải rác trên lúa gieo thẳng.

IV- BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lá lúa: Dự báo thời gian tới điều kiện thời tiết và cây trồng tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh và gây hại trên các giống nhiễm. Để quản lý bệnh đạo ôn có hiệu quả ngay từ đầu vụ, đề nghị các HTX Dịch vụ Nông nghiệp chỉ đạo cán bộ đội chuyên và khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, điều tra phát hiện kịp thời những diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Thực hiện chăm bón cân đối NPK, không bón thừa đạm để hạn chế bệnh gây hại nặng. Khi bệnh đạo ôn xuất hiện trên các giống nhiễm (Nếp thơm, Q5, BC15,...) cần khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Angate 75WP, Filia 525SE, Beam 75WP, Katana 20SC, Kasai-S 92SC, Farmy 750WP, Trizim 650WP,... pha 01 gói /bình 16-18 lít nước, phun kỹ 1-1,5 bình/sào.

2. Chuột hại: Đề nghị các HTX Dịch vụ Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo toàn dân tham gia diệt chuột giai đoạn lúa đẻ nhánh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Áp dụng tổng hợp các biện pháp như: Biện pháp thủ công (đào bắt, soi đập) ; Biện pháp sinh học; Biện pháp sử dụng thuốc hoá học ít độc hại như: Antimice 3DP, Racumin TP 0,75. Diof 5DP, Cat 0.25WP, Gimlet 800SP,...

3. Trừ cỏ hạt nảy mầm: Phòng trừ các loại cỏ sót, cỏ mọc lại trên ruộng lúa gieo vãi, lúa cấy mạ sên như cỏ lồng vục, cỏ chỉ, cỏ chác, cỏ lác,... bằng một trong các loại thuốc sau: Clinchor 200EC, Slicesusamy 200EC, Pullman 300EC Pynachor 5EC, Nominee 10SC, Quinix 32WP, Basagran 480SL,... Thời điểm phun trừ cỏ thích hợp ở giai đoạn cỏ từ 2-3 lá, khi phun hoặc rắc phải đảm bảo thuốc trừ cỏ tiếp xúc được với bề mặt lá và thân cỏ, sau phun xong từ 2-5 ngày cần đưa nước vào ruộng để tăng hiệu quả trừ cỏ.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bình Giang đề nghị các HTX Dịch vụ Nông nghiệp, Trưởng các thôn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- UBND xã; (để báo cáo)
- Phòng Kinh tế;
- HTXDVNN trên địa bàn xã;
- Hộ KD vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Toàn