

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu bệnh hại lúa mùa

Hiện nay, các trà lúa mùa đang giai đoạn: cuối đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng - thấp tho trở. Trên đồng ruộng, bướm sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hóa rộ với mật độ trung bình 3- 5 con/m², nơi cao 15- 30 con/m²; Rầy đa số tuổi 1- 2; Sâu đục thân bướm 02 chấm, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, chuột,... gây hại rải rác.

Để tiếp tục bảo vệ an toàn lúa mùa, Trạm Trồng trọt và BVTV Tư Lộc thông báo:

1. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ:

- Đối với trà lúa mùa sớm giai đoạn đòng- thấp tho trở: phun từ ngày 12/9- 16/9/2025, sử dụng một trong các loại thuốc: *Incipio 200SC*; *Sunset150SC*; *LionKinh50WG*; *EeminGold160SC*;....

- Đối với trà lúa mùa trung giai đoạn cuối đẻ nhánh- đứng cái, làm đòng: phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày: 17/9- 21/9/2025.

Sau phun 2- 3 giờ gặp trời mưa hoặc sau 4- 5 ngày kiểm tra nếu mật độ sâu còn cao phải tiến hành phun lần 2; phun vào buổi sáng lúc khô sương hoặc chiều mát.

Riêng diện tích lúa thấp tho trở thì phải phun kép trước và sau trở 5- 7 ngày để trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân bướm 02 chấm bằng một trong các loại thuốc: *Sunset 150SC*; *Padan 95SP*; *Profast 210EC*; *Dupont Prevathon 5S*,... và bệnh lem lép hạt với phương châm: lúa trở đến đâu phun đến đó.

Kết hợp phun trừ sâu cuốn lá nhỏ với việc phòng trừ trên diện tích lúa nhiễm theo nguyên tắc 04 đúng các loại đối tượng sâu bệnh:

2. Bệnh khô vằn, lem lép hạt:

Phun trên diện tích nhiễm khô vằn, lem lép hạt bằng một trong các loại thuốc: *Tilt Super 300EC*; *Callihex 5SC*; *Validacin 3L, 5L*; *Anvill 5EC*;...

3. Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn:

Tập trung phun trừ trên giống lúa thơm, lúa chất lượng,... bằng một trong các loại thuốc: *Physan 20SL*, *Total 20WP*, *Starnier 20WP*, *Kasumin 2SL*,..... Thời điểm phun thuốc là trước và sau mỗi đợt mưa giông.

4. Rầy:

Tổ chức thăm đồng, kiểm tra kỹ từng gốc lúa, từng nơi trên ruộng lúa, khi thấy rầy tuổi 2- 3 và mật độ 30 con/khóm (1.500 con/m²) trở lên thì phun trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: *Chess 500WG*, *Pexena 20WG*, *Actara 25WG*,...

Trước khi phun thuốc cần giữ nước trong ruộng, rẽ lúa thành băng, mỗi băng từ 4- 6 hàng lúa, phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú; sau phun 3 - 5 ngày phải kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn cao hoặc gặp trời mưa phun lại lần 2.

(Liều lượng, nồng độ và cách dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn ghi trên bao bì)

5. Chuột:

Tiếp tục diệt chuột bằng mọi biện pháp để bảo vệ lúa và rau màu. Ưu tiên sử dụng biện pháp thủ công. Nghiêm cấm mọi hình thức đánh bắt chuột bằng điện.

Nhận được thông báo, đề nghị UBND các xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT và BVTV;
- UBND các xã;
- Phòng kinh tế;
- TTVH-TT-TT;
- Các HTX DVNN;
- Lưu TT.

TRẠM TRƯỞNG



Lê Kiên Quyết