

Số: /HD - UBND

Hà Bắc, ngày

tháng 10 năm 2025

**HƯỚNG DẪN
Các biện pháp hạn chế và xử lý lộc đông cho cây Vải**

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD - TTTVHD ngày 28 tháng 10 năm 2025, của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Dương về các biện pháp hạn chế và xử lý lộc đông cho cây vải.

Do sự biến đổi của khí hậu, do độ phì của đất, do chế độ chăm sóc cây hàng năm. Vì vậy khi bước vào mùa đông cây ra lộc ảnh hưởng rất lớn đến sự ra hoa đậu quả và năng suất vải, đặc biệt trà vải thiều. Để hạn chế cây vải ra lộc đông, xử lý lộc đông và tạo điều kiện cho cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi cần có những biện pháp kỹ thuật tổng hợp để hạn chế thấp nhất tỷ lệ cây không ra hoa của các trà vải. UBND xã khuyến cáo một số biện pháp áp dụng các nguyên lý điều tiết sinh trưởng của cây trồng, như sau:

1. Biện pháp không chế.

- Sử dụng các biện pháp thủ công cắt tỉa cành tăm, cành vượt, cành sâu, trong cây để tạo độ thông thoáng giảm sâu bệnh.

- Trong suốt thời kỳ từ tháng 11 đến đầu tháng 1 năm sau tùy theo từng trà vải, theo dõi sự sinh trưởng của cây, thực hiện rút nước trong vườn vải và phơi gốc để hạn chế sinh trưởng dinh dưỡng, không ra rễ và lộc.

- Xới đất quanh tán: Xới đất quanh tán rộng từ 40-50cm xung quanh hình chiếu tán, cuốc sâu 4-5cm vừa trảm đầu rễ. Việc xới đất vào đầu đông có tác dụng làm khô đất quanh tán cây, làm giảm độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa.

- Tuyệt đối không được bón phân, đặc biệt là phân đạm cho đến khi cây nhú mầm hoa.

- Thực hiện khoanh cành, đối với những cây có bộ lá thành thực và chất đất tốt dùng giao sắc khoanh hết lớp vỏ đến phần gỗ. Có 02 cách khoanh: Khoanh

theo hình xoắn ốc 1,2 -1,5 vòng hoặc khoanh vòng tròn. Sau khi khoanh dùng dung dịch Oxyclorea đồng 1 - 3% bôi vào vết khoanh để hạn chế vi khuẩn, nấm xâm nhập và giúp cành chóng liền sẹo.

- Biện pháp chặn rễ: Khi lộc thu đã thành thực chọn cây có tình trạng sinh trưởng khỏe, khả năng ra lộc đông cao, tiến hành cuộc đứt rễ bằng cách đào rãnh rộng 25-30cm, sâu 20 - 25 cm, phía mép tán cắt đứt một số rễ và để phơi nắng tự nhiên 25 đến 30 ngày. Khi lá chuyển màu thì tiến hành bón phân hữu cơ hoai mục xuống rãnh rồi lấp đất lại, chăm sóc bình thường.

2. Các biện pháp xử lý.

- Đến trung tuần tháng 11 đối với trà vải sớm, vải nhỡ và trung tuần tháng 12 đối với trà vải thiều lá lộc chưa thành thực dùng phân bón qua lá HPC-22 HXN (ra hoa xanh) với liều lượng 40-50ml/bình 16 lít -18 lít phun đều toàn bộ tán cây và phun từ 1-2 lần nhằm giúp lá nhanh thành thực và kích thích sự phân hóa mầm hoa.

- Đối với những cây ra lộc vào tháng 11 đầu tháng 12 phải tích cực xử lý bằng các biện pháp thủ công như tuốt lá, ngắt bỏ những cành lộc, thực hiện với những cây tầm thấp, Đối với những cây cao dùng HPC -22 pha 80-100ml/bình 18 lít phun đều khi lộc nhú dài từ 3-5cm; nếu thời tiết ẩm ẩm phải phun lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

Trên đây là hướng dẫn về các biện pháp hạn chế và xử lý lộc đông cho cây vải. UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến cáo các hộ nông dân trồng vải trên địa bàn xã nắm được để thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Trạm TT&BVTV Hải Dương;
- Chủ tịch; các phó chủ tịch UBND xã;
- Trung tâm VH&TT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chiêm