

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Hà Đông, ngày tháng 12 năm 2025

V/v tăng cường triển khai các biện pháp
phòng, chống bệnh sởi và đảm bảo tỷ lệ
TCMR trên địa bàn xã

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Trạm y tế xã Hà Đông số 1, số 2, số 3;
- Các thôn trong xã;
- Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn xã;

Thực hiện Công văn số 12398/VP-VX ngày 28/11/2025 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi và đảm bảo tỷ lệ TCMR trên địa bàn thành phố.

Tại một số địa phương đã xuất hiện ổ dịch sởi có tính chất khu trú để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi, không để dịch bệnh Sởi bùng phát, lây lan trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin, diễn biến của dịch bệnh, chủ động tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn xã. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế Thanh Hà để triển khai công tác giám sát, hướng dẫn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Sởi tại địa phương, không để dịch bùng phát, lan rộng. Tham mưu cho UBND xã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.

2. Trạm Y tế xã Hà Đông số 1, số 2, số 3

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh Sởi trong cộng đồng, hướng dẫn điều trị, cách ly, khử khuẩn nơi có bệnh nhân. Báo cáo kịp thời về Trung tâm Y tế Thanh Hà theo quy định để phối hợp xử lý, không để dịch lan rộng.

- Chú trọng thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng và đảm bảo tỷ lệ sử dụng vắc xin cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn đẩy mạnh truyền thông về bệnh Sởi và các biện pháp phòng bệnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện “**3 sạch**”: *ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch*; hướng dẫn người dân thường

xuân rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh nhà ở, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt của trẻ em.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình bệnh Sởi định kỳ hoặc đột xuất khi có diễn biến bất thường gửi về UBND xã và Trung tâm Y tế Thanh Hà.

3. Phòng Kinh tế

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, các Trạm y tế tham mưu cho HĐND - UBND xã bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công

Phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp, thông điệp phòng, chống bệnh Sởi và vai trò, lợi ích của tiêm chủng trên hệ thống phát thanh của xã để người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh Sởi.

5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã

Tăng cường công tác tuyên truyền đến giáo viên và học sinh về cách phòng chống bệnh Sởi, vai trò, lợi ích của tiêm chủng; Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lớp học, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa thông thường. Đảm bảo có đủ xà phòng và nước sạch phục vụ cho trẻ và giáo viên rửa tay. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, chảy mũi, viêm kết mạc, hắt hơi, tiêu chảy, phát ban cần thông báo ngay cho Trạm Y tế xã để xử lý, hướng dẫn cách ly và theo dõi.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chủ động phòng bệnh, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

7. Đề nghị Trung tâm Y tế Thanh Hà

Hướng dẫn địa phương cách phòng, chống dịch bệnh Sởi, thông tin về tình hình dịch bệnh Sởi trên địa bàn xã, phối hợp với UBND xã điều tra, giám sát dịch tễ các trường hợp nghi ngờ. Cấp cứu, điều trị kịp thời khi có các trường hợp mắc bệnh.

8. Các thôn trong xã

Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng bệnh, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thôn xóm, báo cáo ngay cho UBND xã và Trạm Y tế khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

9. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Thực hiện tốt công tác phân luồng, bố trí khu vực thu dung người bệnh sởi và nghi ngờ mắc sởi riêng biệt tại khoa Truyền nhiễm, khoa Nhi hoặc các khu vực cách ly của các khoa lâm sàng khác trước khi có chẩn đoán xác định bệnh sởi, chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất cần thiết theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi tại Quyết định số 1019/QĐBYT ngày 26/3/2025 của Bộ Y tế; tăng cường

kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm sởi của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Sởi phải báo ngay cho **Trung tâm Y tế Thanh Hà** hoặc **Trạm Y tế xã** nơi cơ sở đặt trụ sở để điều tra, giám sát, xử lý, không để lây lan ra cộng đồng.

(Thông điệp phòng chống bệnh Sởi gửi kèm Công văn này).

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Đạt

THÔNGIỆP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI

(Gửi kèm Công văn số /UBND-VHXX ngày /12/2025 của UBND xã Hà Đông)

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra. Bệnh sởi có khả năng lây nhiễm rất cao, nhất là đối với trẻ chưa có miễn dịch với vi rút sởi mà tiếp xúc với nguồn lây. Bệnh sởi gây suy giảm miễn dịch, do đó trẻ em mắc bệnh Sởi rất dễ bị biến chứng do đồng mắc các bệnh nhiễm trùng khác.

1. Phương thức lây truyền của bệnh sởi?

- Lây qua đường hô hấp do hít phải các dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bắn ra được khuếch tán trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân.
- Điều kiện ẩm thấp là môi trường thuận lợi nhất cho bệnh sởi lây lan, đặc biệt đối với người chưa có miễn dịch với bệnh sởi.

2) Những dấu hiệu mắc bệnh sởi?

- Sốt 38-40 độ C và sốt liên tục.
- Ho (có thể ho khan, khàn tiếng hoặc có đờm), chảy mũi, viêm kết mạc (dử mắt, phù nhẹ mi), hắt hơi, tiêu chảy.
- Có những hạt nhỏ kích thước khoảng 1 mi-li-mét nổi lên trên niêm mạc má, dễ quan sát khi trẻ há miệng to; nốt có màu trắng hoặc hơi xám, ở vị trí ngang với răng hàm thứ nhất. Dấu hiệu này mất nhanh trong vòng 12 đến 18 giờ.
- Sau khi sốt 3 đến 4 ngày, trẻ bắt đầu phát ban. Đầu tiên ban mọc từ sau tai, lan dần hai bên má, cổ, ngực, chi trên, sau lưng, chi dưới, đến toàn thân. Ban màu hồng nhạt, nhẵn, khi ấn vào thì biến mất, có xu hướng kết dính lại với nhau, phát ban xen giữa những khoảng da lành. Ban có thể rải rác hoặc dày, có thể ngứa ít.
- Trẻ ăn kém, mệt, mỏi. Thường thì 3 bốn 4 ngày sau khi ban mọc, ban sẽ bắt đầu bay thứ tự như khi mọc và để lại vết thâm trên da, có thể có bong vảy nhẹ, khoảng một tuần sau thì không còn dấu vết gì. Trẻ lại sức dần và hết sốt.

Khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sởi nên đưa đến các cơ sở y tế ban đầu gần nhất để được khám, điều trị và hướng dẫn chăm sóc kịp thời, hạn chế chuyển trẻ lên bệnh viện tuyến trên (nơi đang điều trị các ca sởi nặng) để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

3) Cách chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi như thế nào?

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sởi, việc điều trị chủ yếu để phòng bội nhiễm và điều trị các biến chứng nặng do sởi gây ra. Do đó, việc chăm sóc cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng.

- Giai đoạn bệnh nhẹ chủ yếu là chữa triệu chứng như: uống thuốc hạ sốt, nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lý hoặc thuốc nhỏ mắt chloramphenicol 0,1% khoảng 3-4 lần/ngày.
- Ăn đầy đủ thực phẩm dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, uống đủ nước để nâng cao thể trạng, tránh bị suy dinh dưỡng và biến chứng do sởi.
- Vệ sinh thân thể, mắt, răng, miệng cho trẻ và giữ thông thoáng nơi ở, tránh gió lùa.

- Người chăm sóc trẻ phải rửa tay thường xuyên rửa tay bằng thuốc sát khuẩn hoặc rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang
- Cần cách ly trẻ tại nhà để tránh lây nhiễm cho trẻ khác và người nhà.

4) Các dấu hiệu tăng nặng của bệnh sởi?

Bệnh sởi có thể gây các biến chứng nguy hiểm và có thể gây tử vong nên cần theo dõi sát để phát hiện các dấu hiệu tăng nặng của trẻ

- Trẻ khó thở, co kéo nhiều lồng ngực, hoặc có cơn tím tái thở rít
- Trẻ sốt li bì hoặc sốt cao liên tục, uống thuốc hạ nhiệt paracetamol không hạ sốt, hoặc đã hết sốt và có sốt trở lại
- Trẻ co giật hoặc li bì
- Trẻ nôn trớ nhiều hoặc tiêu chảy nhiều lần trong ngày, khát nước nhiều
- Mắt nhiều dử mắt, kèm nhèm nhìn không rõ
- Lúc ban bay, trẻ đã hết sốt nhưng lại sốt lại
- Trẻ có dấu hiệu nghi viêm tai giữa (quấy lúc lắc đầu và đập hoặc dụi bên tai vào vai người mẹ).

5) Các biến chứng sau khi mắc sởi nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời?

- Viêm phổi, viêm tai giữa, viêm thanh quản, viêm não tủy, cam tẩu mã, tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng (do quá kiêng khem), loét giác mạc do thiếu sinh tố (vitamin) A. Các biến chứng này rất nặng và dễ gây tử vong.

6) Đề phòng chống bệnh sởi hiệu quả, người dân phải làm gì?

Tiêm vắc xin sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh sởi. Trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi. Mũi thứ nhất được tiêm cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi. Khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo lịch tiêm chủng hoặc sau khi mắc sởi, trẻ sẽ có miễn dịch bền vững.

- Khi trẻ mắc sởi hoặc nghi ngờ mắc sởi cần cách ly trẻ để tránh lây nhiễm cho trẻ khác.

Hãy đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để không bị mắc bệnh sởi