

THÔNG BÁO

Một số biện pháp tỉa cành, tạo tán, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-TTTVHD ngày 04/6/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương về việc hướng dẫn một số biện pháp tỉa cành, tạo tán, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch; nhằm giúp cây vải phục hồi sinh trưởng, phát triển tốt, tạo tiền đề cho vụ sản xuất vải năm 2026 - 2027 đạt năng suất, chất lượng cao, UBND xã Hà Đông thông báo và đề nghị các hộ trồng vải trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Đốn tỉa, vệ sinh vườn vải:

- Thời gian đốn tỉa: Sau thu hoạch.

- Kỹ thuật đốn tỉa:

+ Với những cây đã thường xuyên được đốn tỉa: Dùng dao phát toàn bộ mặt tán, vị trí phát cách vết đốn năm trước 8 - 10cm. Sau đó tỉa bỏ những cành mọc xiên, cành tăm, cành khuất, cành dập gãy, cành vượt, cành sâu bệnh và một số cành nhỏ ở bề mặt tán để loại bỏ những cành vô ích đặc biệt giúp cây sớm phục hồi sau thu hoạch, đảm bảo cây vải có bộ tán thông thoáng hạn chế sâu bệnh hại.

+ Với những cây không đốn tỉa hàng năm và cây đã khép tán: đốn sâu vào bề mặt tán ở vị trí cành có đường kính 1 - 2cm, tạo tán hình mâm xôi để định hình cành mẹ và giảm độ cao của tán, sau đó tỉa bỏ cành mọc xiên, cành sâu bệnh, một số cành vượt ở giữa tán để tán cây thông thoáng ra cành lộc mới thuận lợi.

- Cần tiến hành cắt tỉa cành, tạo tán đối với các diện tích vải đã thu hoạch xong, kể cả diện tích vải không cho thu hoạch, để đảm bảo cho cây vải sinh trưởng phát triển đồng đều.

- Sau khi đốn tỉa cành tạo tán phải vệ sinh vườn, làm cỏ và thu gom cỏ cành khô, cành sâu, bệnh (đặc biệt là những vườn vải nhiễm rệp sáp và rệp kim), rác, quả rụng mang đi tiêu hủy để giảm nguồn sâu, bệnh lan truyền sang vụ sau.

Lưu ý: Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao các hộ nông dân tạm ngừng cắt, tỉa cành. Đối với những cây đã tiến hành đốn tỉa sâu nên sử dụng quần áo cũ cuốn hoặc che phủ các đầu cành cắt để hạn chế mất nước và khô đầu cành. Sử dụng thân lá, cành không mang dịch hại sau cắt tỉa để ủ gốc giữ ẩm cho cây.

2. Chăm bón:

- Mục đích: Cung cấp dinh dưỡng giúp cây phục hồi, ra lộc mạnh, đúng thời điểm, hạn chế ra quả cách năm, đảm bảo cho cây ra từ 2 - 3 đợt lộc (lộc hè và lộc thu). Để cho cây chuyển sang giai đoạn phân hóa mầm hoa thuận lợi.

- Thời gian bón: Bón thúc lộc 2 - 3 lần/năm, lần 1 sau khi đốn tỉa và lần cuối trước 10/10/2026

Lưu ý: Đối với vùng trũng, vùng tiêu úng chậm, nếu cắt tỉa cành muộn và chưa bón thúc lộc trước 15/7 thì chỉ bón thúc lộc 1 - 2 lần/năm; lần 1 cuối tháng 8 để tránh những đợt ngập úng có thể xảy ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 gây chết cây.

- Liều lượng bón:

Đường kính tán (m)	Đạm urê (kg)	Supe lân (kg)	Kali sunphat (kg)	Phân chuồng (kg)
1,0 – 1,5	0,1 - 0,15	0,3 - 0,35	0,05 - 0,1	10 - 15
2,0 – 2,5	0,15 - 0,2	0,35 - 0,4	0,1 - 0,15	10 - 20
3,0 – 3,5	0,2 - 0,25	0,4 - 0,5	0,15 - 0,2	10 - 20
4,0 – 4,5	0,25 - 0,3	0,5 - 0,6	0,2 - 0,25	40 - 50
5,0 – 5,5	0,3 - 0,35	0,7 - 0,8	0,25 - 0,3	40 - 50
6,0 – 6,5	0,35 - 0,4	0,8 - 0,9	0,3 - 0,35	40 - 50
> 6,5	0,5	1,0	0,4	50

(Nếu vải trồng trên đất xấu, cây yếu thì dùng phân bón lá bổ sung).

- Nếu sử dụng phân đa lượng các hộ nông dân ưu tiên sử dụng các loại phân bón có hàm lượng đạm và lân cao.

- Cách bón:

+ Bón phân chuồng: đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu của tán với bề mặt rãnh rộng 20 - 30 cm, sâu 30 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước giữ ẩm. Hoặc có thể đào 3 rãnh theo hình vành khăn xung quanh tán để bón.

+ Bón phân vô cơ: khi đất ẩm chỉ cần rải phân lên mặt đất theo hình chiếu của tán, sau đó tưới nước để hoà tan phân. Khi trời khô hạn cần hoà tan phân trong nước để tưới hoặc rải phân theo hình chiếu của tán, xới nhẹ đất và tưới.

3. Phòng trừ sâu bệnh:

- Đối với những vườn vải nhiễm rệp vảy, rệp sáp sau khi tỉa cành tạo tán các hộ nông dân chú ý thu gom những cành lá cắt tỉa đem tiêu hủy bằng cách đốt hoặc đào hố chôn vùi (đào hố, cho cành, lá bị hại xuống hố sau đó nên rắc một lớp vôi bột lên bề mặt trước khi lấp đất).

- Dùng thuốc Glim 270SC hoặc Javipas450EC, Selecron 500EC phun khi phát hiện mật độ rệp trên 5% số cành để hạn chế nguồn rệp lây lan sang vụ sau.

- Khi cây bắt đầu ra lộc non cần chú ý phun trừ các loại dịch hại như: sâu cuốn lá, sâu đo, sâu cuốn tổ: dùng Repdor 250EC hoặc Peran 50EC, ... kết hợp với 1 loại thuốc sinh học có hoạt chất Ebamectinbenzoat phun trừ khi thấy sâu xuất hiện từ 2 con/cành trở lên.

- Đối với bệnh sùi cành: Dùng dao cùn cạo sạch các vết bệnh (không cạo sâu vào phần vỏ cây) sau đó dùng dung dịch Boocđô 2% phun toàn bộ thân cành hoặc quét vào gốc từ mặt đất lên 1,5m.

Lưu ý: Sau khi cắt tỉa thu gom cành lá ra khỏi vườn. Tuyệt đối không đốt cành lá trong vườn để gây nguy cơ cháy vườn.

4. Tổ chức thực hiện

- Đề nghị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thông báo rộng rãi nội dung Thông báo này đến các hộ trồng vải trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc cây vải sau thu hoạch theo hướng dẫn.

- Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã phối hợp với các thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng truyền thông số về các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch.

- Đề nghị các hộ trồng vải chủ động thực hiện việc cắt tỉa cành, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn; thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh.

UBND xã Hà Đông đề nghị các cơ quan đơn vị, các thôn và các hộ trồng vải trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm bảo đảm cây vải sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trong vụ vải năm 2026 - 2027./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Mạnh Cường