

Số: /TB-UBND

Hùng Thắng, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại

Thực hiện Công văn số 422/CCTSCNTY-NTTS ngày 03/11/2025 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y về việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, xu thế thời tiết các tháng mùa đông 2025 có khả năng lạnh hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn so với năm 2024. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại, bất lợi, Ủy ban nhân xã yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế: Tăng cường kiểm tra, phân công cán bộ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn ứng phó trong giai đoạn chuyển mùa, phòng chống rét cho thủy sản nuôi; tăng cường thông tin tới người nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống về diễn biến thời tiết, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ giảm sâu, thay đổi nhiệt độ lớn, có thể rét đậm, rét hại kéo dài.

2. Trung tâm sự nghiệp công: Tăng cường thông tin qua hệ thống thông tin đại chúng, bản tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã về công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại.

3. Các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản:

- Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, nguyên, nhiên vật liệu, dụng cụ cần thiết để chủ động phòng, tránh khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra.

- Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá chuối, cá rô đồng, ếch, baba, cá vược, cá chim vây vàng..., chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra thiệt hại thủy sản nuôi bị chết do rét.

- Trong suốt thời gian rét đậm, rét hại, không dùng lưới, các loại phương tiện thu tủa để bắt cá, tránh cá bị xây sát dẫn đến bị nhiễm bệnh các bệnh như đốm đỏ, lở loét da do nấm, trùng quả dưa, ký sinh trùng... gây ra. Trường hợp ao đầm có thủy sản nuôi bị chết không rõ nguyên nhân phải thu gom tập trung, xử lý và báo ngay cho

cơ quan chức năng để xử lý; không đưa thủy sản chết, thải nước ao đầm chưa xử lý ra môi trường ngoài.

- Tuyệt đối không sử dụng các loại phân gia súc, gia cầm tươi bón trực tiếp xuống ao, đây là con đường truyền nhiễm bệnh giun sán, liên cầu khuẩn... và là ký chủ trung gian ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Đối với đàn thủy sản nuôi lưu giữ qua đông nên chọn tại những ao đáp ứng điều kiện ở nơi khuất gió, có cây cối hoặc nhà che chắn. Nếu ao ở hướng gió thì nên đào ao sâu ở hướng Bắc để làm nơi cho cá trú ngụ trong mùa rét; có nhà bạt phục vụ lưu giữ qua đông.

- Hạn chế thả giống trong mùa đông; chỉ tổ chức thả giống đối với các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho động vật thủy sản.

4. Một số biện pháp sau:

a. Chăm sóc, quản lý ao nuôi:

- Luôn luôn giữ mực nước tối thiểu từ 1,5 - 2,0 m. Mặt ao thả bèo tây, khoảng 2/3 diện tích ao được ngăn lại tránh tản đều khắp ao hoặc trồng chuối theo hàng về phía Bắc, che chắn bằng vật liệu thích hợp để chắn gió.

- Làm sọt tránh rét: Tạo một góc ao sâu về phía Bắc, dùng các sọt đan bằng tre lầy rơm rạ dùng nước vôi phun vào sát trùng, phơi thật khô ấn đầy vào sọt, cắm cọc đơm sọt xuống đáy ao. Sau 10 - 15 ngày thấy rơm rạ đã bị phân hủy thì vớt lên tránh gây ô nhiễm môi trường ao nuôi.

- Đối với những ao nuôi có diện tích nhỏ, bể nuôi lưu giữ cá thì làm giàn trên mặt ao, bể và che phủ bằng bạt nylon để tăng khả năng giữ nhiệt độ.

- Giữ môi trường nước trong ao ổn định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ sâu, pH, hàm lượng oxy, màu nước...; những ngày mù trời, lặng gió cần tăng cường quạt nước, sục khí, sử dụng viên bổ sung oxy để tránh thiếu oxy và hiện tượng phân tầng nước. Định kỳ 2 lần/tháng sát khuẩn môi trường nước bằng nước vôi trong tẻ (tạt) xuống ao với hàm lượng 1 - 2 kg/100m² hoặc các sản phẩm khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất; khi thấy nước ao bị ô nhiễm, nên sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường làm sạch nước cho ao nuôi như EM, BKC, VICATO...

- Khi nhiệt độ từ 14°C trở lên, tranh thủ cho cá ăn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung thêm vitamin C, B.complex vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho cá với lượng dùng từ 3 - 5g/kg thức ăn. Với thức ăn công nghiệp nên chọn loại cám có hàm lượng đạm cao từ 28% trở lên để giúp cá hồi phục sức khỏe sau thời gian chống rét. Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18°C, nên giảm 1/2 lượng thức ăn cho cá ăn. Khi nhiệt độ nước xuống thấp dưới 14°C cần ngừng cho cá ăn.

- Dọn sạch cỏ, rác trong ao và thức ăn thừa ở nơi cho cá ăn. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có hướng xử lý kịp thời khi có thay đổi bất thường xảy ra.

b. Chăm sóc, quản lý lồng bè nuôi trên sông:

- Di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả sâu lồng nuôi 1,8-2,0 m.
- Treo túi vôi hoặc hóa chất khử trùng ở đầu dòng chảy để khử trùng nước, phòng bệnh cho thủy sản nuôi lồng bè trên sông; định kỳ vệ sinh 1 lần/1 tuần lồng, bè nuôi nhằm loại bỏ rác và các vật cứng bám vào lồng, bè nuôi.
- Bổ sung vitamin B1, C... vào khẩu phần ăn với lượng 3-5g/kg thức ăn để nâng cao sức khỏe đàn cá nuôi trong lồng.

Đề nghị Phòng Kinh tế, Trung tâm sự nghiệp công, tổ chức, cá nhân hộ gia đình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã thường xuyên cập nhật tình hình và thông tin về Ủy ban nhân dân xã, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y để phối hợp chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Chi cục TS, CN và Thú y;
- Chủ tịch, các PCT-UBND xã;
- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Nhuận