



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC TRỪ CHUỘT THỂ HỆ MỚI NHẤT ANTIMICE 3DP

1. Thành phần hoạt chất:

Bromadiolone 3g/kg + phụ gia

2. Công dụng:

- **Antimice 3DP** là thuốc trừ chuột với thành phần hoạt chất Bromadiolone thuộc nhóm chống đông máu thế hệ thứ 2.
- **Antimice 3DP** có cơ chế tác động là sau khi ăn phải bả hoặc liếm lông dính bả, chuột bị nhiễm độc gan, mao mạch bị phá vỡ, liên tục chảy máu trong, gây chết chậm nên thường bỏ vào hang, ngạt thở và chết sau 3 đến 7 ngày.
- **Antimice 3DP** hấp dẫn với chuột hơn, tính chống đông máu mạnh hơn các loại thuốc chống đông máu thế hệ 1, nên chỉ cần ăn với liều rất thấp đã gây chết chuột.
- Thuốc không mùi, không gây hiện tượng ngán bả, hiệu quả trừ chuột kéo dài.
- Thuốc ít độc với người và môi trường nên được dùng để diệt chuột cho cả khu dân cư, các trang trại và ngoài đồng ruộng.
- Giá cả hợp lý đối với bà con nông dân.

3. Hướng dẫn sử dụng:

Trộn gói 10g với 3-5 lạng mồi (thóc luộc sôi từ 60-90 phút cho hạt thóc nở ra, vớt cho ráo vỏ rồi trộn thuốc thật đều, cũng có thể dùng mòng mại hoặc khoai lang băm nhỏ), rồi đặt thành 10-15 phần trên diện tích 2-3 sào bắc Bộ (đối với cây lúa) trên đường đi, cạnh các cửa hang, gần nơi chuột phá hoại, gò đống và không ngập nước (3-5m đặt 1 bả). Đối với những cây trồng khác như: rau màu, cây ăn quả, v.v.... Những nơi mật độ chuột cao nên sử dụng tăng lượng bả. Lượng phổ biến sử dụng 0,1-0,15 kg/ha.

4. Quy cách:

Đóng gói 10g, 10 gói/1 hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ/1 hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ/1 thùng (1.000 gói/1 thùng).

5. Đơn vị đăng ký:

- **ANTIMICE 3DP** do Công ty Cổ phần ENASA Việt Nam đăng ký