

Số: /TB-UBND

Kiến Hải, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn chuyển mùa năm 2025

Căn cứ Công văn số 422/CCTSCNTY-NTTS ngày 03/11/2025 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y về việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn dân cư, tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người dân

1.1. Tình hình thời tiết

Theo dự báo, mùa đông năm 2025 có khả năng xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn so với năm 2024, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã.

1.2. Khuyến cáo kỹ thuật phòng, chống rét

Các hộ dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

- Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, nguyên, nhiên vật liệu, dụng cụ cần thiết để chủ động phòng, tránh khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra.
- Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá chuối, cá rô đồng, ếch, ba ba, ..., chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra thiệt hại thủy sản nuôi bị chết do rét.
- Trong suốt thời gian rét đậm, rét hại, không dùng lưới, các loại phương tiện thu tủa để bắt cá, tránh cá bị xây sát dẫn đến bị nhiễm bệnh các bệnh như đốm đỏ, lở loét da do nấm, trùng quả dưa, ký sinh trùng... gây ra.
- Trường hợp ao đầm có thủy sản nuôi bị chết không rõ nguyên nhân phải thu gom tập trung, xử lý và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý; không đưa thủy sản chết, thải nước ao đầm chưa xử lý ra môi trường ngoài.
- Tuyệt đối không sử dụng các loại phân gia súc, gia cầm tươi bón trực tiếp

xuống ao, đây là con đường truyền nhiễm bệnh giun sán, liên cầu khuẩn... và là ký chủ trung gian ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Đối với đàn thủy sản nuôi lưu giữ qua đông nên chọn tại những ao đáp ứng điều kiện ở nơi khuất gió, có cây cối hoặc nhà che chắn. Nếu ao ở hướng gió thì nên đào ao sâu ở hướng Bắc để làm nơi cho cá trú ngụ trong mùa rét; có nhà bạt phục vụ lưu giữ qua đông.

- Hạn chế thả giống trong mùa đông, chỉ tổ chức thả giống đối với các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho động vật thủy sản.

- Chăm sóc, quản lý ao nuôi:

- + Luôn luôn giữ mực nước tối thiểu từ 1,5-2,0 m. Mặt ao thả bèo tây, khoảng 2/3 diện tích ao được ngăn lại tránh tản đều khắp ao hoặc trồng chuối theo hàng về phía Bắc, che chắn bằng vật liệu thích hợp để chắn gió.

- + Làm sọt tránh rét: Tạo một góc ao sâu về phía Bắc, dùng các sọt đan bằng tre lấy rơm rạ dùng nước vôi phun vào sát trùng, phơi thật khô ấn đầy vào sọt, cắm cọc đơm sọt xuống đáy ao. Sau 10-15 ngày thấy rơm rạ đã bị phân hủy thì vớt lên tránh gây ô nhiễm môi trường ao nuôi.

- + Đối với những ao nuôi có diện tích nhỏ, bể nuôi lưu giữ cá thì làm giàn trên mặt ao, bể và che phủ bằng bạt nilon để tăng khả năng giữ nhiệt độ.

- + Giữ môi trường nước trong ao ổn định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ sâu, pH, hàm lượng oxy, màu nước...; những ngày thời tiết thay đổi, lạnh gió cần tăng cường quạt nước, sục khí, sử dụng viên bổ sung oxy để tránh thiếu oxy và hiện tượng phân tầng nước. Định kỳ 2 lần/tháng sát khuẩn môi trường nước bằng nước vôi trong tẻ (tạt) xuống ao với hàm lượng 1-2 kg/100m² hoặc các sản phẩm khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất; khi thấy nước ao bị ô nhiễm, nên sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường làm sạch nước cho ao nuôi như: EM, BKC, VICATO...

- + Khi nhiệt độ từ 14⁰C trở lên, tranh thủ cho cá ăn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung thêm vitamin C, B.complex vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho cá với lượng dùng từ 3-5g/kg thức ăn. Với thức ăn công nghiệp nên chọn loại cám có hàm lượng đạm cao từ 28% trở lên để giúp cá hồi phục sức khỏe sau thời gian chống rét. Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18⁰C, nên giảm 1/2 lượng thức ăn cho cá ăn. Khi nhiệt độ nước xuống thấp dưới 14⁰C cần ngừng cho cá ăn.

- + Dọn sạch cỏ, rác trong ao và thức ăn thừa ở nơi cho cá ăn. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có hướng xử lý kịp thời khi có thay đổi bất thường

xảy ra.

- Đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chủ động sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; theo dõi, chăm sóc đàn bố mẹ để chủ động sinh sản, cung ứng nguồn giống thủy sản phục vụ sản xuất các tháng cuối năm 2025, đầu năm 2026.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Phòng Kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra thực địa các vùng nuôi. Tổng hợp, báo cáo tình hình định kỳ về Ủy ban nhân dân xã và Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y.

2.2. Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông

Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông của xã.

Tăng cường cập nhật và phát tin dự báo thời tiết, cảnh báo rét đậm, rét hại kịp thời, chính xác; đảm bảo thông tin được truyền tải liên tục, rộng rãi và dễ tiếp cận đến các cơ sở thôn, hộ nuôi trồng thủy sản.

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc biên soạn nội dung, tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân chủ động áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng chống rét hiệu quả.

2.3. Trưởng thôn các thôn dân cư

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại. Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện thủy sản chết không rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý hạn chế lây lan dịch bệnh./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông;
- Các thôn dân cư;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quyết