

Số:25353 /TB-UBND

Kiến Hải, ngày 23 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc tăng cường phòng, chống sinh vật gây hại trên lúa vụ
Mùa năm 2026 trên địa bàn xã**

Trong những ngày qua, khu vực Hải Phòng có thời tiết diễn biến phức tạp, đầu kỳ có mưa vừa, mưa to, sau đó lượng mưa giảm, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng; độ ẩm không khí vẫn ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại phát sinh, phát triển trên cây trồng.

Hiện nay, các trà lúa vụ Mùa trên địa bàn xã Kiến Hải chủ yếu đang ở giai đoạn phân hóa đòng - trổ, một số trà lúa sớm đã bước vào giai đoạn chắc xanh. Nhìn chung, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, qua theo dõi đồng ruộng, một số đối tượng sinh vật gây hại như sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn đã xuất hiện và gây hại; ngoài ra còn có chuột, bệnh đạo ôn lá, bệnh lem lép hạt gây hại rải rác.

Trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục có khả năng nắng, mưa xen kẽ, độ ẩm không khí cao, thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, gia tăng mật độ, đặc biệt trên các diện tích lúa đang và chuẩn bị trổ. Nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời, rầy có thể gây vàng, lụi từng chòm, thậm chí gây cháy rầy; bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa vụ Mùa năm 2026.

Để chủ động phòng, chống sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất, Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân; thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh từ ngày 23/9/2026 đến ngày 06/10/2026, với tần suất 03 lần/ngày, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với sâu đục thân hai chấm

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sâu đục thân hai chấm trên các trà lúa giai đoạn làm đòng - trổ bông. Phòng trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² trở lên, thời điểm phun khi lúa đòng già - nứt bẹ - trổ bông.

Đối với diện tích có mật độ ổ trứng cao, thực hiện phun lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, đúng đối tượng, liều lượng và hướng dẫn trên nhãn thuốc.

2. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy trên đồng ruộng, nhất là các diện tích lúa sau trổ. Phun trừ khi mật độ rầy đạt ngưỡng cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đối với diện tích lúa ở giai đoạn trổ bông - ngậm sữa, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng nội hấp, lưu dẫn; diện tích lúa giai đoạn chắc xanh - đổ đuôi, sử dụng thuốc có tác dụng tiếp xúc theo hướng dẫn.

Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng, phun trực tiếp dung dịch thuốc vào gốc lúa - nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả phòng trừ.

3. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông

Đối với các giống lúa có nguy cơ nhiễm bệnh như Nếp, TBR225, BC15, Đài Thơm 8..., cần chủ động phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông theo phương châm “lúa trổ đến đâu phun thuốc đến đó” và phun lại lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, có mưa, độ ẩm cao.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phòng trừ bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và trên nhãn thuốc.

4. Đối với bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt

Theo dõi thường xuyên bệnh khô vằn trên đồng ruộng; thực hiện phun trừ đối với những diện tích có tỷ lệ bệnh đạt ngưỡng cần xử lý.

Đối với bệnh lem lép hạt, chủ động phòng bệnh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, mưa kéo dài, trời âm u, độ ẩm không khí cao; thời điểm phun thích hợp khi lúa thấp thỏ trổ.

5. Đối với các đối tượng gây hại khác

Tiếp tục theo dõi diễn biến chuột, bệnh đạo ôn lá và các đối tượng sinh vật gây hại khác để kịp thời áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp, hạn chế thiệt hại trên cây lúa.

6. Một số lưu ý trong phòng trừ sinh vật gây hại

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thuốc, đúng đối tượng, đúng liều lượng, đúng thời điểm, theo hướng dẫn trên nhãn thuốc và của cơ quan chuyên môn.

Không tự ý phối trộn nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong cùng một bình phun; khi cần phun kép, thực hiện luân phiên thuốc theo hướng dẫn.

Nên phun thuốc vào sáng sớm khi đã khô sương hoặc chiều mát. Trường hợp sau khi phun 3-4 giờ gặp mưa to, mưa rào làm ướt lá, rửa trôi thuốc, cần theo dõi và thực hiện phun bổ sung theo hướng dẫn chuyên môn.

Thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và bỏ đúng nơi quy định; không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng, kênh mương, nguồn nước.

Chủ động bảo vệ sức khỏe người sản xuất, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi pha và phun thuốc bảo vệ thực vật.

Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo rộng rãi để Nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTĐU, TTHĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng XDNN&MT;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các thôn;
- Lưu: VT, XDNN&MT, Bùi Trọng Khiêm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quyết