

Số: /HD-UBND

Kiến Thụy, ngày tháng năm 2026

HƯỚNG DẪN
Chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2026

Hiện nay, diện tích lúa vụ Mùa trên địa bàn xã cơ bản đã được gieo cấy xong trong khung thời vụ tốt nhất. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe, đạt năng suất và chất lượng cao Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2026, như sau:

1. Bón phân

* *Nguyên tắc bón*: Bón lót 100% diện tích trước khi cấy, bón thúc sớm “*Bón nặng đầu, nhẹ cuối*”, đảm bảo lúa đẻ nhánh tập trung, tăng số danh hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh hại.

* *Lượng bón*

- Phân đơn: Super lân 15kg/sào; Đạm Urê 5kg/sào; Kali clorua 4-6kg/sào.

- Phân tổng hợp NPK: Tăng cường sử dụng các dạng phân tổng hợp NPK (phân lân Văn Điển, Lâm Thao, Việt Nhật, Hải Hà...) đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm.

* *Cách bón*

- Phân đơn: bón lót 100% phân lân, bón thúc 1 sau cấy 5 -7 ngày khi lúa bắt đầu bén rễ hồi xanh 100% phân đạm + 2kg kali, bón đón đòng 3kg kali.

- Phân tổng hợp NPK: Bón lót 50% lượng phân NPK, bón thúc 1 sau cấy 5 -7 ngày khi lúa bắt đầu bén rễ hồi xanh 50% lượng phân NPK + 2kg đạm, bón đón đòng 2 – 3kg kali.

* *Lưu ý*: Khi bón phân ruộng phải có nước, tuyệt đối không dùng phân đạm hoặc phân có hàm lượng đạm cao để bón đón đòng, chỉ nên dùng phân Kali đơn để bón nhằm hạn chế bệnh bạc lá lúa.

2. Điều tiết nước

Vụ mùa thường gặp những trận mưa rào lớn vì vậy việc điều tiết nước cần thực hiện theo phương châm: “*Giữ cạn lòng ruộng, tưới nông mặt ruộng*”. Giữ nước đậm 1 - 2 cm sau cấy 7 – 10 ngày và đưa nước ngập 3 – 5 cm vào ruộng từ 18 – 25 ngày để lúa tiếp tục đẻ nhánh.

* *Lưu ý*: Những thửa ruộng không bằng phẳng, những mảnh ruộng hay mất nước cần đắp bờ ngăn để điều tiết nước và ngăn mất nước.

3. Trừ cỏ dại

Khuyến cáo các hộ làm thủ công phá váng tạo độ thông thoáng cung cấp oxy giúp bộ rễ phát triển hạn chế ngẹt rễ, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hạn chế

sử dụng thuốc trừ cỏ, trường hợp không có điều kiện về nhân lực có thể sử dụng một số thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, hậu nảy mầm như: Sofit 300 EC, Star 10 WP, Sunrice 15 WDG,...

4. Bệnh nghệt rễ, vàng lá sinh lý

Khi phát hiện cây lúa bị nghệt rễ, vàng lá sinh lý, cần ngừng bón phân đạm; tháo cạn nước và bón từ 10–15 kg vôi bột/sào hoặc 10–15 kg phân lân nung chảy/sào, kết hợp làm cỏ và sục bùn nhằm giải phóng khí độc trong đất.

Sau khi cây lúa ra rễ mới, tiến hành phun bổ sung phân bón qua lá để giúp cây phục hồi nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt.

* *Lưu ý:* Đối với những diện tích lúa bị nghệt rễ, vàng lá sinh lý, tuyệt đối không phun thuốc bảo vệ thực vật.

5. Diệt ốc bươu vàng

* *Biện pháp thủ công:* Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng; khơi rãnh quanh ruộng để dẫn dụ ốc tập trung, thuận tiện cho việc thu gom và tiêu hủy; sử dụng phên hoặc lưới 3 lớp chắn tại các cửa lấy nước nhằm ngăn ốc xâm nhập vào ruộng lúa.

* *Biện pháp hóa học:* Khi mật độ ốc bươu vàng đạt từ 3 con/m² trở lên, có thể sử dụng một trong các loại thuốc như Pazol 700WP, Catfish 70WP... để phòng trừ. Việc pha thuốc và sử dụng phải tuân thủ đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

* *Lưu ý:* Khi phun thuốc cần duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2–3 cm để đạt hiệu quả phòng trừ cao.

6. Đối với chuột hại

- Đánh chuột phải tập trung ngay từ đầu vụ bằng các biện pháp như dùng mồi, đặt bẫy bả, bắt thủ công để đạt hiệu quả cao.

* *Lưu ý:*

Tuyệt đối không sử dụng điện lưới để bẫy, đánh chuột. Việc dùng điện lưới để diệt chuột là hành vi nguy hiểm, vi phạm quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và những người đi lại trên đồng ruộng.

Ủy ban nhân dân xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề nghị các hộ nông dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà sử dụng biện pháp nguy hiểm này.

Ngoài các đối tượng trên, thường xuyên kiểm tra thăm đồng, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ đầu vụ. Khi phát hiện rầy mang virus lùn sọc đen và những diện tích có mật độ rầy cao (1000 con/m²) phải tiến hành phun trừ rầy kịp thời. Đối với những ruộng lúa khi phát hiện triệu chứng nhiễm bệnh lùn sọc đen (cây xanh đậm, thấp lùn một số lá xoắn đầu hoặc xoắn lá...) phải tiêu hủy (nhỏ bỏ, vùi sâu) kịp thời để hạn chế nguồn lây bệnh trên đồng ruộng và phun trừ rầy triệt để.

Có thể sử dụng một số loại thuốc như: Apta 300WP, Oshin 20WP, Chess 50WG,...liều lượng, nồng độ theo hướng dẫn.

Trên đây là hướng dẫn chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2026, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các thôn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:

- TT ĐU (*Báo cáo*);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Xây dựng, NN và MT;
- TT DV sự nghiệp công;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hưởng