UBND XÃ KIM THÀNH
TRUNG TÂM DV SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 20 /CV-TTDVSNC
V/v phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa vụ Mùa từ nay tới cuối vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kim Thành, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:
- Lãnh đạo các cơ quan liên quan;
- Giám đốc HTXDVNN Kim Thành;
- Trưởng các thôn.

Hiện nay lúa Mùa 2026 trên địa bàn xã Kim Thành đang chủ yếu ở giai đoạn đòng già, thấp tho trỗ một số diện tích lúa đang ở giai đoạn chắc xanh.

Để bảo vệ năng suất và chất lượng lúa mùa muộn từ nay đến cuối vụ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đề nghị Lãnh đạo các cơ quan liên quan, Giám đốc HTXDVNN Kim Thành, Trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nông dân phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh sau:

1. Sâu đục thân: Bướm sâu đục thân 2 chấm vũ hóa từ trà lúa mùa sớm, mùa trung di chuyển đến trà lúa mùa muộn đẻ trứng, sâu non nở và gây hại trên trà lúa mùa muộn. Tiến hành phun trừ trên lúa khi lúa đòng già - thấp tho trỗ, trên trà lúa mùa muộn bắt buộc phải phun kép 2 lần (trước trỗ và sau khi trỗ thoát). Phun theo phương châm lúa trỗ đến đâu phun trừ tới đó. Một số loại thuốc có thể sử dụng để phun trừ sâu đục thân, như: Incipio 200SC, Prevathon 200SC, Abagent 500WP, Niliprole 108SC, Padan 95SP, Chlorferan 240SC,...

2. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non lứa 7 nở rộ và gây hại vào đầu tháng 10 trên những diện tích lúa chưa trỗ.

- Những diện tích lúa trỗ sau ngày 04/10/2026 có mật độ sâu non từ 20 con/m^2 trở lên cần tiến hành phun trừ.
- Thời gian phun trừ từ 4-7/10/2026.
- Sử dụng một số loại thuốc như: Incipio 200SC, Chlorin 10SC, Solo 350SC, Dofenapyr 140SC, DHA Japane 180SC, Ammate 150EC, Clever 150SC,... Có thể kết hợp phun trừ cùng sâu đục thân.

3. Rầy: Từ nay đến cuối vụ, rầy tiếp tục gia tăng về số lượng và mức độ gây hại. Các hộ cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy rầy có mật độ từ 1.500 - 2.000 con/m^2 trở lên thì tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Chess 50WG, Bom hủy diệt, Fidur 220 EC, Makoto 50WG...

4. Bệnh đạo ôn (cổ bông, cổ giié): Phun phòng trên lúa trỗ, có thể kết hợp phun trừ cùng sâu đục thân. Do điều kiện thời tiết hiện nay thích hợp cho bệnh phát sinh gây hại nên tiến hành phun 2 lần, lần 2 khi lúa trỗ thoát (cách lần 1 từ

5-7 ngày). Một số loại thuốc đặc trị như: Beam 75WP, Filia 525SE, Fujione 40EC, Ninja 35EC, Amistar top 325SC, ...

5. Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát triển và gây hại từ nay đến cuối vụ. Phun trừ khi thấy tỷ lệ bệnh từ 10 - 20% số dảnh trở lên bằng các loại thuốc như: Anvil 5SC, Hecwin 5SC, Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC, NewTec 300SC, …

6. Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Qua kiểm tra đồng ruộng, đã phát hiện bệnh và gây hại, cần tiến hành phun trừ kịp thời bằng một số loại thuốc đặc hiệu như: Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Lobo 8WP, Xantocin 40WP,...

7. Bệnh lem lép hạt: Phun cùng với sâu đục thân bằng một số loại thuốc, như: Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC, NewTec 300SC, …

**** Lưu ý:***

- Khi phun thuốc tránh thời điểm lúa phơi màu vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của lúa.

- Nếu phun thuốc xong từ 3-4 giờ gặp mưa (ướt lá, rửa trôi thuốc) phải tiến hành phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ.

- Thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV bỏ vào nơi quy định, bảo vệ môi trường.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực ĐU, HĐND xã; } Để bc
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: TT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ KIM THÀNH T.P HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Tiến Thành