

Số: 07/TB-TTĐVSNC

Kim Thành, ngày 13 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA VÀ DỰ BÁO
TRONG THỜI GIAN TỚI

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Từ đầu tháng 5, do ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh yếu, nền nhiệt độ hạ thấp, trời có mưa rào và dông. Đến giữa tháng 5, trời nắng, nhiệt độ tăng dần lên, nhiệt độ TB 23 - 26°C, Cao 30 - 32°C, ẩm độ trung bình 75 - 85%.

2. Cây trồng

- Trà lúa sớm: đang giai đoạn chín - thu hoạch.

- Trà lúa muộn: đang giai đoạn đòng - đở đuôi.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 tiếp tục nở và gây hại trên những diện tích lúa chưa trổ.

2. Sâu đục thân: Trưởng thành sâu đục thân di chuyển từ trà lúa xuân sớm xuống trà lúa xuân muộn đẻ trứng, sâu non nở gây bông bạc trên lúa xuân muộn giai đoạn trổ bông, tập trung ở những ruộng ven làng, gần đường đi, gần ánh sáng đèn.

3. Rầy (rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng): xuất hiện rải rác trên các trà lúa, mật độ trung bình 100 - 300 con/m², cao 500 - 700 con/m², cục bộ 1500 con/m², chủ yếu rầy cám - trưởng thành. Trong thời gian tới, rầy sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên các trà lúa.

4. Bệnh khô vằn: gây hại chủ yếu trên những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, bón phân không cân đối, cấy dày,... Bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển, gia tăng về diện tích và tỷ lệ bệnh trên trà xuân muộn từ nay đến cuối vụ.

5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: tỷ lệ bệnh trung bình 3 - 5%, cao 7 - 10%, Thời gian tới, bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển, gia tăng về diện tích và tỷ lệ bệnh, đặc biệt sau các trận mưa dông và giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông.

III. ĐỀ NGHỊ

Để bảo vệ lúa xuân 2026, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt việc phòng trừ sinh vật gây hại, cụ thể như sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Do có hiện tượng nở rai rác, gổi lúa nên người dân cần kiểm tra trên những diện tích lúa chưa trở nếu thấy mật độ sâu non còn cao (từ 20 con/m² trở lên) thì tiến hành phun trừ từ 15-20/5/2026 bằng một số loại thuốc, như: Incipio 200SC, Solo 350SC, Dofenapyr 140SC, DHA Japane 180SC, Ammate 150EC, Clever 150SC,...

2. Đối với sâu đục thân

Tiến hành phun trừ sâu đục thân 2 chấu trên lúa giai đoạn đòng già - thấp tho trở khi mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m² trở lên. Một số loại thuốc có thể sử dụng phun trừ sâu đục thân như: Prevathon 200SC, Voliam Targo 063SC, Abagent 500WP, Niliprole 108SC, ...

3. Đối với rầy

Các hộ nông dân cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện kịp thời, tiến hành phun trừ khi thấy có mật độ rầy từ 1.000 con/m² trở lên (40 - 50 con/khóm) trên lúa giai đoạn trở thoát trở đi; mật độ 1.500 - 2.000 con/m² trở lên trên lúa chưa trở.

- Nếu lúa còn xanh (trở thoát - chắc xanh) tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Chess 50WG, Bom hủy diệt, Fidur 220 EC, Makoto 50WG, Marshal 200SC, Mopride 20WP, Dyman 500WP,

- Khi lúa đã già (chắc xanh - chín) dùng một trong các loại thuốc tiếp xúc như: Bom hủy diệt, Opal 50WG, Topten 400WP, Tiffy super 500WP, ... Ruộng lúa phải có nước, rạch hàng từ 0.8 - 1m để phun trực tiếp vào rầy.

4. Đối với bệnh khô vằn

Phun trừ khi tỷ lệ bệnh từ 10 - 20% số dảnh trở lên thì tiến hành phun trừ, một số loại thuốc phun trừ bệnh khô vằn như: Anvil 5SC, Hecwin 5SC, Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC...

5. Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn

Tuyệt đối không bón đạm (Urê), hoặc phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng trên những ruộng lúa đã xuất hiện bệnh gây hại; có thể phun phòng bệnh cho các giống nhiễm (lúa lai) bằng một số loại thuốc: Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Lobo 8WP,

6. Bệnh lem lép hạt

Chủ động phun phòng khi cây lúa ở giai đoạn đòng già - thấp tho trở bằng một số loại thuốc đặc hiệu, như: Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC, NewTec 300SC, ... có thể kết hợp với phun trừ với sâu đục thân.

*** Lưu ý:**

- Đối với những diện tích lúa ở giai đoạn đòng già - trỗ bông cần phải đảm bảo có nước trong ruộng để cây lúa phát triển thuận lợi, trỗ thoát, tránh hiện tượng nghẹn đòng.

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông dân cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng cách. Không phối trộn nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong 01 bình phun. Thu gom vỏ bao gói thuốc, vỏ chai thuốc sau sử dụng bỏ vào nơi quy định, bảo vệ môi trường./.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐU, HĐND xã;
 - Lãnh đạo UBND xã;
 - Các cơ quan liên quan;
 - Lưu: VT
- } để bc

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiên Thành