

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ NAM SÁCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Nam Sách, ngày tháng 05 năm 2026

V/v phòng trừ rầy gây hại lúa từ nay  
đến cuối vụ Đông Xuân 2025-2026

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn.

Hiện nay, lúa Đông Xuân đại trà trên địa bàn xã đang trong giai đoạn chắc xanh – đổ đui, diện tích lúa cấy sớm bắt đầu cho thu hoạch. Trong tuần vừa qua trời nắng, mưa xen kẽ, nhiệt độ từ 26 – 31<sup>0</sup>C, ẩm độ 70 – 90% là điều kiện thuận lợi cho rầy phát sinh, gây hại. Theo Dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian từ nay đến hết tháng 6, khu vực Hải Phòng có khả năng diễn ra từ 2-3 đợt nắng nóng, đồng thời xuất hiện một số đợt mưa lớn cục bộ kèm theo dông lốc, áp thấp nhiệt đới và bão xuất hiện bất thường, nguy cơ cao phát sinh rầy gây hại cuối vụ.

Căn cứ Thông báo số 10/TTTVCL ngày 20/05/2026 của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật Chí Linh về tình hình rầy gây hại trên lúa vụ Đông Xuân. Theo kết quả điều tra trên đồng ruộng của trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chí Linh đến ngày 19/5/2026 trên các trà lúa chắc xanh - đổ đui, rầy đã bắt đầu nở rộ trên các giống lúa Nếp các loại, lúa lai, Đài thơm 8, TBR 225... Mật độ rầy phổ biến từ 500 – 1000 con/m<sup>2</sup> tuổi 2 – tuổi 3 đến trưởng thành, nơi cao tới 1.500 con/m<sup>2</sup>, cá biệt có ở 2.000 con/m<sup>2</sup>, nơi có mật độ cao như cánh đồng thôn Đụn, xã Nam Sách. Trong những ngày tới, rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 sẽ tiếp tục nở, tăng nhanh về mật độ và diện tích gây hại từ nay đến cuối tháng 5/2026 và trên các giống lúa giai đoạn chắc xanh - đổ đui - chín; nếu không được kiểm tra, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời, đúng kỹ thuật sẽ có nhiều diện tích lúa bị “cháy rầy” gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất lúa.

Để giúp nông dân chủ động phòng trừ rầy hiệu quả, hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do rầy gây ra, bảo vệ an toàn năng suất lúa vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026, UBND xã Nam Sách yêu cầu các cán bộ kỹ thuật, Trưởng các thôn và các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết và tình hình sinh vật gây hại và thực hiện tốt một số nội dung sau:

## 1. Kỹ thuật phát hiện

- Rầy non mới nở có màu trắng sữa, sau chuyển thành màu nâu hay nâu đen. Rầy tuổi 1, 2 gọi là rầy nâu. Rầy trưởng thành có 2 loại cánh ngắn và cánh ngắn.

- Cả rầy non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây làm cây sinh trưởng kém và chết (cháy bệnh).

- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy trên cây lúa (vạch gốc lúa để kiểm tra), nếu thấy mật độ từ 40 con/khóm trở lên thì phải phun trừ ngay.

## 2. Biện pháp phòng trừ

Để phun thuốc trừ rầy có hiệu quả phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 đúng như sau:

- Đúng thuốc:

+ Đối với những ruộng lúa chín sữa hoặc đang thấp tho trở bông nếu có rầy thì sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp lưu dẫn mạnh để phun trừ và không cần phải rẽ lúa. Sử dụng một số loại thuốc sau để trừ: Chess 50WG, Chattot 600WG, Vua rầy, TEN PY RAM 50%.

+ Đối với những ruộng lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến đỏ đuôi khả năng vận chuyển các chất trong cây kém vì vậy ta phải dùng hỗn hợp thuốc mang tính tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu và lưu dẫn mạnh như sau: 2 gói Chess 50WG hoặc các thuốc có hoạt chất Nitenpyram: 1 gói Vua Rầy cộng với 30ml thuốc Profast 210 EC phun trực tiếp vào con rầy, Nitenpyram 50% Acnipyram 50WP... Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 0,8 - 1,0 m) phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả của thuốc. 1 sào phải phun từ 2 bình 16 lít nước thuốc.

- Đúng lúc: Vào sáng sớm hoặc chiều mát, ruộng phải có nước.

- Đúng cách: Phun thuận theo chiều gió, khi trời mát, phun thấp vòi để thuốc tiếp xúc trực tiếp vào con rầy

- Đúng liều lượng: Dùng theo hướng dẫn trên bao gói, phải phun đủ lượng nước, thuốc trên đơn vị diện tích.

\* Lưu ý:

- Nếu mật độ cao 100 – 200 con/khóm trở lên phun xong, 5-6 ngày sau phải kiểm tra lại nếu thấy vẫn còn mật độ trên 40 con/khóm phải phun lại lần 2.

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun; pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; sau khi phun thuốc 3-4 giờ gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả

*phun trừ; nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát; thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định.*

*- Đối với các diện tích lúa đổ ngã cần khẩn trương tháo nước trong ruộng và tiến hành tủa buộc ngay để hạn chế nguy cơ cháy rầy và nảy mầm của hạt lúa làm giảm năng suất và chất lượng.*

*- Chủ động thu hoạch sớm đối với diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; ưu tiên thu hoạch trước tại các vùng trũng thấp, diện tích dễ bị đổ ngã.*

Để phòng trừ rầy đạt hiệu quả UBND xã yêu cầu các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp bán đúng chủng loại thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đề nghị phòng Kinh tế xã quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng, tuyên truyền nội dung hướng dẫn; Trưởng các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ rầy nâu gây hại cho cây lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 đạt hiệu quả.

Trên đây là hướng dẫn tập trung phòng trừ đối tượng rầy nâu gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ Đông Xuân 2025-2026 của UBND xã Nam Sách. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế hoạch sản xuất đề ra./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

**CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Diện**