

CẢNH BÁO MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG NGẬP LỤT ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Chủ động tiêu úng kịp thời – Chăm sóc phục hồi nhanh – Giảm thiểu thiệt hại – Ổn định sản xuất

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

1 LÚA MỚI GIEO, MỚI CẤY (1-10 ngày sau gieo cấy)

- Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập từ 1–2 ngày: Cây sinh trưởng chậm, lá hơi vàng, bén rễ chậm nhưng vẫn có khả năng phục hồi sau khi tiêu úng.
Ngập từ 2–4 ngày: Cây bén rễ chậm, sinh trưởng yếu, một số danh bị chết, mật độ giảm cục bộ; cần chăm sóc phục hồi và tỉa dặm.
Ngập trên 4 ngày: Nhiều khóm bị chết, mật độ giảm đáng kể, sinh trưởng kém; cần kiểm tra để tỉa dặm hoặc cấy bổ sung.
- Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Cây vàng lá, chậm bén rễ, sinh trưởng chậm nhưng có khả năng phục hồi.
Ngập 2–4 ngày: Rễ thiếu ôxy, thối rễ, chết danh, mật độ giảm đáng kể (Nhất là diện tích mới gieo cấy bộ rễ còn yếu có thể chết hoàn toàn).
Ngập trên 4 ngày: Thiệt hại nặng, khả năng phục hồi rất thấp, cần gieo hoặc cấy lại.

2 GIAI ĐOẠN ĐỂ NHÁNH

- Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 3 ngày: Ảnh hưởng nhẹ, phục hồi sau khoảng 5–7 ngày.
Ngập 3–4 ngày: Giảm đẻ nhánh, lá vàng, cần bón thúc sau tiêu úng.
Ngập trên 4 ngày: Nhiều danh chết, năng suất giảm mạnh.
- Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Có khả năng phục hồi.
Ngập 3–4 ngày: Khả năng phục hồi giảm nhiều, ảnh hưởng năng suất.
Ngập trên 4 ngày: Phần lớn lúa chết hoặc phục hồi rất kém.

3 GIAI ĐOẠN LÀM ĐỒNG

- Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 2 ngày: Có thể phục hồi, ảnh hưởng nhỏ.
Ngập 3–4 ngày: Đồng phát triển kém, tỷ lệ hạt lép tăng.
Ngập trên 4 ngày: Năng suất giảm rõ rệt.
- Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Có thể phục hồi nếu nước rút nhanh.
Ngập 2–4 ngày: Nhiều đồng thiếu ôxy, ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng.
Ngập trên 4 ngày: Đồng dễ bị thối, khả năng phục hồi rất thấp.

4 GIAI ĐOẠN TRỎ BÔNG PHƠI MÀU

- Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 1 ngày: Cây vẫn tiếp tục trổ.
Ngập 2–3 ngày: Quá trình thụ phấn bị ảnh hưởng, tỷ lệ lép tăng, giảm năng suất.
Ngập trên 3 ngày: Bông trổ không hoàn toàn, tỷ lệ lép cao, năng suất giảm mạnh.
- Ngập hoàn toàn cây lúa
Ngập dưới 1 ngày: Đã bắt đầu ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn.
Ngập 1–2 ngày: Giảm năng suất nghiêm trọng.
Ngập trên 2 ngày: Thiệt hại rất lớn, có thể mất trắng nhiều diện tích.

- Nếu còn trên 70% mật độ: Giữ lại, vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, cỏ dại, té nước rửa lá, tỉa dặm bảo đảm mật độ, chăm sóc phục hồi.
- Nếu cây chết nhiều, còn dưới 50% mật độ, mật độ không bảo đảm: Gieo cấy lại nếu thời vụ còn cho phép (muộn nhất không quá 15 ngày tính từ thời điểm kết thúc lịch thời vụ)
- Tiếp tục thực hiện chăm sóc khi cây lúa có dấu hiệu phục hồi hoặc sau gieo cấy lại.



- Vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, cỏ dại, té nước rửa lá,...
- San tía danh đến khi bị mất khoảng để đảm bảo mật độ;
- Chăm sóc: Bón phân thúc kịp thời bằng phân bón giàu lân; sử dụng phân lân hợp lý để kích thích ra rễ mới, phục hồi sinh trưởng. Có thể kết hợp sử dụng phân bón lá sinh học hoặc chế phẩm sinh học nhằm tăng khả năng phục hồi của cây.



- Vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, cỏ dại, té nước rửa lá.




- Vệ sinh đồng ruộng, dựng buộc diện tích bị đổ



KHẨN TRƯỞNG KHƠI THÔNG ĐỒNG CHÁY, TIÊU THOÁT NƯỚC NHANH, KỊP THỜI, KHÔNG ĐỂ TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG KÉO DÀI. SAU KHI TIÊU ÚNG CẦN THEO DÕI CHẶT CHẼ DIỄN BIẾN SÂU BỆNH HẠI ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ KỊP THỜI, HIỆU QUẢ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG !!!

- ❖ Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lớn, bão, lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất.



- ❖ Chủ động tiêu úng càng sớm càng tốt; thời gian ngập càng kéo dài thì khả năng phục hồi của cây lúa càng giảm.



- ❖ Đối với diện tích thiệt hại nặng, không còn khả năng phục hồi cần kịp thời quyết định gieo cấy lại hoặc chuyển đổi sang cây trồng phù hợp theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.



➡ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ KỊP THỜI – CHĂM SÓC LÚA PHỤC HỒI HIỆU QUẢ - ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT LÚA ⬅