

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO
VỆ THỰC VẬT HẢI PHÒNG
TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT CHÍ LINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/TB-TTTVCL

Trần Phú, ngày 24 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng

Hiện nay cơ bản các trà lúa Mùa trên địa bàn các xã, phường đang sinh trưởng phát triển tốt, trong đó trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn thấp tho trở đến chín sữ; trà lúa Mùa trung đang đứng cái, làm đòng đến thấp tho trở bông, Mùa muộn đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh; cây rau màu chủ yếu là dưa, ngô, mướp, ớt, cà chua rau gia vị, rau ăn lá, ... đang ở giai đoạn từ cây con - thu hoạch; các loại cây trồng khác như: chuối, ổi, nhãn, hoa cây cảnh ... sinh trưởng phát triển khá tốt.

Do ảnh hưởng của bão số 4, nên từ ngày 21/8 đến ngày 24/8 khu vực Hải Phòng có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 70 – 150 mm, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập úng cục bộ trên nhiều diện tích lúa Mùa và cây rau màu hè thu.

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ngập úng, sâu bệnh đến cây trồng, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chí Linh hướng dẫn một số biện pháp khắc phục sau mưa bão và phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng như sau:

I. Các loại cây rau màu: Là nhóm cây trồng đặc biệt nhạy cảm với nước, rễ chịu thối rất kém. Khi ruộng bị ngập sâu, bộ rễ bị ngạt hoàn toàn do oxy và nấm bệnh trong nước tấn công rất nhanh. Để khắc phục tối đa, bà con cần khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục như sau:

Khẩn trương thu hoạch ngay những diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch để tránh thối hỏng, giảm giá trị thương phẩm.

Khơi thông mương rãnh, bơm thoát nước đảm bảo không để nước cao ngập luống gây thối cây, thối rễ cây rau màu; Cắt bỏ bộ phận bị hỏng, nhổ bỏ cây chết, xới phá váng giúp đất thoáng khí, đưa oxy xuống nuôi lại bộ rễ, chăm sóc kịp thời cho cây sinh trưởng phát triển.

Dặm cây bị chết, nâng cây bị đổ ngã, cắm giàn, buộc thân, nhánh kịp thời đối với cây họ dây leo, tay leo.

Tuyệt đối không bón các loại phân hóa học gốc (Đạm, NPK, Lân) hoặc phân chuồng chưa hoại mục lúc này. Phun các chế phẩm kích thích ra rễ và chống sốc cho cây như (Super Humate, Comcat, Atonik) kết hợp với phân bón lá giàu vị lượng đặc biệt là Canxi –Boron để giúp cây tái tạo tế bào, hạn chế rụng quả, nứt quả và tăng sức đề kháng.

Phòng trừ bệnh tổng hợp: Ngay sau khi nước rút, thời tiết tạnh ráo là thời điểm nấm bệnh và vi khuẩn phát sinh phát triển và gây hại. Tiến hành phun phòng trừ bệnh hại kịp thời:

- Phòng bệnh thối gốc, lở cổ rễ, cháy mù thân: Tưới gốc hoặc phun bằng các loại thuốc đặc trị như Aliette 800WG, Ridomil Gold 68WG, Metalaxyl 500WP,...
- Phòng thối nhũn vi khuẩn và Sương mai; Phun kết hợp thuốc trừ vi khuẩn và bệnh sương mai: Starner 20WP, Ychatot 900SP, Amistar Top 325SC, Antracol 70WP,...

Đối với những diện tích cây rau màu bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng phục hồi cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất để gieo trồng lại bằng những cây rau ngắn ngày, cây trồng thích hợp để cung tăng hệ số sử dụng đất và cung cấp rau cho thị trường lúc giáp vụ.

II. Cây lúa vụ mùa:

1. Chăm sóc và phục hồi cây lúa:

Rút nước khẩn cấp: Bơm tháo nước khẩn cấp, khơi thông toàn bộ hệ thống rãnh thoát để rút nước nhanh ra khỏi ruộng. Không để lúa bị ngập ngộp kéo dài gây thối bẹ, thối đồng, ảnh hưởng sinh trưởng phát triển của cây lúa.

Chưa bón phân hóa học ngay nhất là phân Đạm hoặc NPK ngay khi mới rút nước.

Những diện tích lúa bị ngập trắng sau khi nước rút phun bổ sung các chất kích thích ra rễ và phân bón lá vi lượng (như Atonik 1.8SL, ComCat 150WP, Super Humate, phân bón lá giàu Kali, vi lượng Kẽm, Canxi) để cây phục hồi, kích thích rễ mới nhanh phát triển, giảm sốc cho lúa.

Khi rễ trắng mới xuất hiện, tiến hành bón bổ sung Kali để tăng độ cứng cây, mẩy hạt và kháng bệnh.

2. Phòng trừ sâu bệnh:

2.1. Bệnh Bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn: Trong điều kiện mưa rào và đông kéo dài (từ ngày 21/8 đến 24/8) Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn sẽ phát sinh phát triển và gây hại nặng trên các giống nhiễm như TBR 225, Nếp Hương, BT7, Đài Thom, BC15,...

Biện pháp phòng trừ: Khi phát hiện thấy ruộng chớm bị bệnh cần giữ mực nước từ 2-3 cm, ; tuyệt đối không bón phân Đạm đơn (Urê), phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng. Sử dụng các loại thuốc sau đây để phòng trừ bệnh bạc lá: Physan 20SL, Vi Sen 20SC, Starner 20WP.

Sử dụng hỗn hợp thuốc Ychatot 90SP + Athuoclop 480SC để phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn.

2.2. Bệnh đạo ôn cổ bông; Bệnh thường bùng phát trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều, nhiệt độ dao động từ 20-28°C và có sương mù đêm, bệnh gây hại trên các giống nhiễm như Nếp, BC15, TBR 225..., Bệnh phát sinh gây hại vào giai đoạn lúa thấp tho trở bông. Chủ động phun thuốc phòng bệnh từ giai đoạn lúa thấp tho trở bông (trở từ 1-3% bông). Sử dụng một trong các loại

thuốc sau: Feliso 360EC, Kasai-S 92SC, Fuamy 40EC, Bump 650WP, Fenil bgo 40SC,....

2.3. Đối với Sâu cuốn lá nhỏ

- Tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích lúa có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên (đối với những diện tích lúa ở giai đoạn đứng cái - làm đòng); 50 con/m² trở lên (đối với những diện tích lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh),

+ Thời gian phun trừ: Thời gian phun trừ tốt nhất tập trung từ ngày 04/9 - đến ngày 10/9/2026.

+ Lưu ý: Những diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao (mật độ trên 100 con/m²) nhất thiết phải tiến hành phun kép, lần 2 sau lần 1 từ 3-5 ngày; sau phun 3-4 giờ gặp trời mưa phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ. Nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát.

+ Thuốc phun trừ: Nên lựa chọn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng hoạt chất *Isocycloseram*, *Indoxacarb*, *Emamectin benzoate*, *Chlorfenapyr*... để phun trừ sâu cuốn lá như: Incipio 200SC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Chloferan 240SC, Dofenapyr 140SC, Emin gold 160SC, ..

2.4. Sâu đục thân: Phun trừ sâu đục thân ở những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ /m² khi lúa đòng già - nứt bẹ - thấp tho trở (trở từ 1-3% bông) bằng một trong các loại thuốc như: Cartap 95SP, Caral 95SP, Prevathon 35WG, VoliamTargo 63SC,... Nếu mật độ ổ trứng cao cần phun nhắc lại lần 2, cách lần 1 từ 5-6 ngày.

2.5 Rầy nâu, rầy lưng trắng: Thường xuyên kiểm tra ruộng thấy mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở lên trên lúa chưa trổ, mật độ từ 1.000 con/m² trở lên trên lúa sau trổ, sử dụng các loại thuốc như: Chess 50WG, Vua rầy (Acdinosin 50WP), Chese Super 35WG để phun trừ. Cần tăng cường chú ý trên các diện tích gieo cấy giống Bắc thơm số 7, Nếp, Q5, Đài thơm 8,...

2.6. Nhện gié: Trên các ruộng đang trở đến chắc xanh khi có triệu chứng của nhện gié (5% bẹ lá đòng có vết cạo gió) hoặc bông lúa bị nhện gié hại trước trổ thường thấy hiện tượng bông lúa không trổ thoát, hạt lép, bông lúa hoặc thân đòng bị cong queo. Toàn bộ cuống bông lúa và hạt lúa bị biến màu từ trắng vàng sang màu nâu, hạt lúa xuất hiện những lốm đốm màu nâu đen ở vỏ trấu, nếu bị nặng toàn bộ hạt trên bông lúa biến màu nâu đen và đôi khi hạt trên bông bị biến dạng méo mó.

Cần kiểm tra ruộng thường xuyên để phát hiện sớm nhện gié. Nếu có nhện gié gây hại, cần phun thuốc diệt trừ ngay từ khi mật số còn thấp với thuốc đặc trị nhện là Nilmite 550SC, Kinagold 23EC, Obamax 25EC.

2.7. Bệnh khô vằn - lem lép hạt: Bệnh khô vằn: Phun trừ bệnh khô vằn trên những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số dảnh trở lên.

Bệnh lem lép hạt: Phun phòng chống bệnh lem lép hạt khi thời tiết có nắng mưa xen kẽ, mưa kéo dài, trời âm u, ẩm độ không khí cao; thời điểm phun thuốc khi lúa thấp tho trở.

Thuốc sử dụng phun trừ: Tilt super300EC, Amistar Top 325SC, Camilo 150SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin5SC, Anvil 5 SC...

2.8. Đối với chuột hại: Tiếp tục tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp, trong đó từ nay đến cuối vụ cần tăng cường áp dụng các biện pháp thủ công, truyền thống để diệt chuột như: tổ chức săn bắt chuột, đổ nước, hun khói, đặt bẫy cạm,... ***Tuyệt đối không dùng điện để đánh chuột.***

III. Đề nghị UBND các xã, phường: Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chí Linh

-Huy động tối đa lực lượng khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh mương nhanh chóng tiêu thoát nước, không để tình trạng úng ngập kéo dài ảnh hưởng đến cây trồng.

- Đơn vị chuyên môn, HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

- Hệ thống đài truyền thanh thôn, xã, phường tăng thời lượng tuyên truyền nông dân tích cực thăm đồng, tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây rau màu đảm bảo đúng lịch, đúng diện tích; trong quá trình phun thuốc cần tuân thủ nguyên tắc bốn đúng, mang đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động và tích cực thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV về đúng nơi quy định của địa phương./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV (để báo cáo);
- UBND các xã, phường: Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú, Hợp Tiến, Chu Văn An, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Nguyễn Trãi, Chí Linh, Trần Nhân Tông (quan tâm chỉ đạo);
- Các HTXDVNN;
- Phòng Kinh tế, Xây dựng nông nghiệp và Môi trường
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, phường;
- Lưu.

TRAM TRƯỜNG



Vũ Thị Chanh