

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM SÁCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDNNMT
V/v tập trung phòng trừ rầy hại lúa
mùa năm 2026

Nam Sách, ngày tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường ;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Sách;
- Các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn.

Thực hiện Công văn số 1119/CCTTBVT-VN ngày 21/9/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tập trung phòng trừ rầy hại lúa vụ Mùa 2026; Thông báo số 14/TB-TTTVCL của Trạm Trồng trọt và BVTV Chí Linh về tình hình rầy gây hại trên lúa vụ Mùa.

Hiện nay, lúa vụ Mùa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn chắc xanh, đổ đúi. Thời gian qua, thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiều ngày có mưa to đến rất to, là điều kiện thuận lợi cho rầy phát sinh phát triển và gây hại lúa cuối vụ mùa. Theo kết quả điều tra trên đồng ruộng của chuyên môn đến ngày 18/9/2026 trên các trà lúa, rầy đã bắt đầu nở rộ, mật độ trung bình: 300 - 500 con/m², nơi cao: 1000 - 1.500 con/m², cá biệt có ổ rầy: 2.000 - 3.000 con/m². Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố dự báo, những ngày tới khu vực Hải Phòng thời tiết có nắng mưa xen kẽ, là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu tiếp tục nở, gia tăng mật độ và gây hại diện rộng trên đồng ruộng, nếu không được phòng trừ kịp thời, hiệu quả, sẽ có nhiều diện tích lúa bị rầy hại gây “cháy rầy” không cho thu hoạch, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Mùa 2026.

Để giúp nông dân chủ động phòng trừ rầy hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy gây ra, bảo vệ sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch đề ra, UBND xã Nam Sách hướng dẫn nông dân cách phát hiện và biện pháp phòng trừ như sau:, cụ thể như sau:

1. Kỹ thuật phát hiện

- Rầy non mới nở có màu trắng sữa, sau chuyển thành màu nâu hay nâu đen. Rầy tuổi 1, 2 gọi là rầy cám.

- Rầy trưởng thành có 2 loại cánh dài và cánh ngắn. Cả rầy non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây làm cây sinh trưởng kém và chết (cháy rầy). Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy trên cây lúa

(vạch gốc lúa để kiểm tra) phun trừ kịp thời khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (35-40con/khóm) trở lên; đối với những diện tích lúa chưa trổ bông, phun trừ với mật độ 2.000 con/m² thì phải phun trừ ngay.

2. Biện pháp phòng trừ

- Hướng dẫn nông dân kiểm tra lúa vụ Mùa sau trổ bông, phát hiện và phun trừ kịp thời khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (35 - 40 con/khóm) trở lên; đối với những diện tích lúa chưa trổ bông, phun trừ với mật độ 2.000 con/m² trở lên.

- Những diện tích lúa ở giai đoạn lúa trổ bông - ngâm sữa, nên sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Pexena 20WG, Titan 600WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Hecman 60WG, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...

- Những diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh - đở đuôi khả năng vận chuyển các chất trong cây kém vì vậy ta phải dùng hỗn hợp thuốc mang tính tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu và lưu dẫn mạnh như sau: 1 gói Chess 50WG hoặc 1 gói Chattot 60WG cộng với 30ml thuốc Profast 210 EC phun trực tiếp vào con rầy. 1 sào phải phun từ 2 bình 16 lít nước thuốc. Hoặc sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Hecman 60WG, Actara 25WG,... Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 4-5 hàng lúa khoảng 0,8 - 1,0 m) phun trực tiếp dung dịch thuốc vào gốc lúa - nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả trừ rầy.

- Những diện tích lúa đã chín có khả năng cho thu hoạch có mật độ rầy cao - có nguy cơ gây “cháy rầy” cần chỉ đạo nông dân “gặt chạy” để đảm bảo an toàn nông sản, tiến hành thu hoạch sớm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” đảm bảo năng suất chất lượng lúa vụ Mùa.

*** Lưu ý:**

- Khi phun thuốc trừ rầy cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng; đối với vùng sản xuất tập trung diện tích lớn nếu sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) để phun trừ cần chủ động kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun sớm khi rầy tuổi nhỏ (rầy cám) vào giai đoạn cây lúa còn xanh có khả năng lưu dẫn thuốc trừ rầy; hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) phun thuốc trừ rầy khi cây lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín để đảm bảo hiệu quả phun trừ.

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun; sau khi phun thuốc 3-4 giờ gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ; thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định bảo vệ môi trường.

Để phòng trừ rầy đạt hiệu quả, UBND xã yêu cầu các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp bán đúng chủng loại thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đề nghị phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng, tuyên truyền nội dung hướng dẫn; đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Sách chủ động điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cho nông dân phòng trừ rầy cuối vụ an toàn, hiệu quả; Trưởng các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng trừ rầy đạt hiệu quả, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa.

Trên đây là hướng dẫn về phòng trừ rầy hại lúa vụ Mùa 2026 của UBND xã Nam Sách. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế hoạch sản xuất đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, PXDNNMT.

CHỦ TỊCH

Phùng Văn Diện