

Số: 06/TB-TTĐVSNC

Nam Triệu, ngày 04 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tập trung phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2026

Thời tiết những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xuất hiện các trận mưa vừa đến mưa to, đây là điều kiện thuận lợi cho cây lúa trở bông, nước tưới cho cây trồng... nhưng cũng thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại phát sinh gia tăng mức độ gây hại như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm, bệnh khô vằn, sâu đục thân hai chấm, rầy...

Đến nay, các trà lúa vụ Xuân 2026 trên địa bàn phường Nam Triệu chủ yếu đang ở giai đoạn đồng già-trở bông. Nhìn chung, các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt dự kiến lúa sẽ trở tập trung từ ngày 10/5-20/5/2026.

Theo kết quả điều tra theo dõi đồng ruộng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã vũ hóa rộ và đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ trưởng thành phổ biến 1-2con/m², nơi cao 4-5con/m², cá biệt có nơi 8-10 con/m². Mật độ trứng phổ biến 40-50 quả/m², nơi cao 80-100 quả/m², cá biệt 150-200 quả/m²; sâu non bắt đầu nở, mật độ phổ biến 30-50 con/m², nơi cao 80-100 con/m². Ngoài ra, các đối tượng dịch hại khác như: bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm, bệnh khô vằn, sâu đục thân hai chấm, rầy... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trong thời gian tới.

Đề hạn chế thấp nhất thiệt hại do một số đối tượng sinh vật gây hại như trên gây ra, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2026 .

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo tới các hộ nông dân tăng cường bám sát đồng ruộng thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Chỉ phun trừ trên những diện tích lúa đến ngày 05/5/2026 chưa trở có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên, đối với những diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m² nhất thiết phải phun kép 2 lần, phun lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày.

+ Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 từ ngày: 07/5/2026 đến ngày 12/5/2026.

+ Thuốc sử dụng: Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ sâu cuốn lá nhỏ: Incipio 200SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Solo 300WG, Sunset 300WG, Clever 150SC, Obaone 95WG,...

- Đối với sâu đục thân 2 chấm: Phun trừ cho những diện tích lúa giai đoạn đòng già nứt bẹ - thấp tho trở khi có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² trở lên. Đối với diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,5 ổ/m² trở lên phải tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. Sử dụng các loại thuốc như: Incipio 200SC, Voliam Targo 063SC, Prevathon 5SC, Minecto Star 60WG, Chlorferan 240SC,...

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm (Nếp, BC15, TBR225, Đài Thơm 8, Khang dân 18...) giai đoạn lúa đòng già nứt bẹ - thấp tho trở từ nay đến cuối vụ. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Filia 525SE, Kasoto 200SC, Beam 75WP, Bankan 600WP, Bump 650WP, Fuji-one 40EC, Amistatop 325SC...

- Đối với bệnh khô vằn, đen lép hạt: Nông dân phun trừ trên những diện tích lúa nhiễm bệnh khô vằn, đen lép hạt có tỷ lệ bệnh trên 20% số dành trở lên. Sử dụng một trong các thuốc sau để phun trừ: Tilt Super 300EC, Amistar Top 325SC, Nevo 330EC, Chevil 5SC, Anvil 5SC,...

*** Lưu ý:** Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ gói, chai thuốc; phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ, thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc sau sử dụng bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường; **tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.**

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại... để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường
- PGĐ TTDVSNC
- UBMTTQ và các đoàn thể phường
- Phòng KTHT&ĐT
- Các HTX SXKDDV nông nghiệp
- Các đ/c Tổ trưởng TDP
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chi Hiếu