

Số: /TB-UBND

Nghi Dương, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Đông – Xuân đến ngày 28/4/2026

I. Thời tiết và sinh trưởng của lúa

Trong những ngày qua, thời tiết âm u, nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại phát sinh phát triển gây hại lúa vụ Đông Xuân.

Đến nay, các trà lúa trên địa bàn xã Nghi Dương chủ yếu đang ở giai đoạn trở bông – chín hoàn toàn. Nhìn chung, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

II. Tình hình sinh vật gây hại và dự báo trong thời gian tới

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa. Mật độ phổ biến từ 100 – 200 con/m², nơi cao 300 – 400 con/m², cá biệt có điểm 700 – 800 con/m² (Thôn Xuân Chiếng)

2. Bệnh Khô vằn

Bệnh đã xuất hiện và gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 15-20%, cá biệt 30-40% số dảnh (Thôn 4 Du Lễ, Thôn Xuân Chiếng,...)

Ngoài ra, còn một số đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu đục thân lúa hai chấm, chuột hại, bệnh đốm nâu,... vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại trên đồng ruộng

III. Đề nghị

Để bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông - Xuân năm 2025 - 2026, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

Chỉ đạo hướng dẫn nông dân kiểm tra những diện tích lúa ở giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh - chín phát hiện kịp thời phun trừ khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (40 - 50 con/khóm); giai đoạn chưa trở bông có mật độ 2.000 con/m² trở lên.

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh, có thể sử dụng thuốc BVTV có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Pexena 20WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín, nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như Actara 25WG, Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Acnipyram 50WP, Titan 600WG... Cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 4 - 6 hàng lúa) và phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả của thuốc.

- Khi phun trừ rầy cần giữ nước trong ruộng, sau khi phun thuốc 3 - 5 ngày phải kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn cao hoặc sau khi phun thuốc gặp trời mưa phải phun lại để đảm bảo hiệu quả.

- Trên những diện tích lúa ở giai đoạn chín có mật độ rầy cao, có nguy cơ “cháy rầy” không nên phun thuốc bảo vệ thực vật và chỉ đạo thu hoạch sớm “gặt chạy” với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” đảm bảo an toàn nông sản.

2. Đối với bệnh khô vằn:

Kiểm tra đồng ruộng, phun trừ bệnh khi tỷ lệ bệnh từ 20% số danh trở lên, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun trừ: Tilt super 300EC, Amistar Top 325SC, Camilo 150SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5 SC...

3. Các sinh vật gây hại khác

- Đối với sâu đục thân lúa hai chấu: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân 2 chấu trên trà lúa chưa trổ, hướng dẫn nông dân phun trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ trứng/m² trở lên, phun lần 1 khi lúa đòng già - nứt bẹ, phun lần 2 khi lúa trổ thoát.

- Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Voliam targo 063SC, Prevathon 5SC, Padan 95 SP, Sattrungdan 95WP... để phòng trừ sâu đục thân 2 chấu.

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tuyệt đối không bón đạm (Urê), hoặc phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng trên những ruộng lúa đã xuất hiện bệnh gây hại; có thể phun phòng bệnh cho các giống nhiễm (lúa lai) bằng một số loại thuốc: Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Lobo 8WP,...

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục hướng dẫn nông dân phun trừ theo Thông báo số 1006 ngày 02/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương Về việc Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông Bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2026 trên những diện tích giống lúa nhiễm bệnh trổ từ nay đến đầu tháng 5/2026.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu cuốn lá nhỏ, dự báo tình hình phát sinh sâu cuốn lá nhỏ lúa 3, để có biện pháp chỉ đạo hiệu quả trên những diện tích lúa Xuân muộn trễ sau trung tuần tháng 5/2026.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình chuột hại, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép hạt... để có biện pháp quản lý thời gian tới.

** Lưu ý:*

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun;
- Luân phiên các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần;
- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc, phun thuốc xong 3-4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại; thu gom vỏ bao gói thuốc sau sử dụng đúng nơi quy định.

Nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất nông nghiệp theo Công văn số 1018/TB-UBND ngày 10/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TT HĐND(b/c);
- CT, các PCT UBND xã (b/c);
- VP HĐND-UBND xã;
- TT sự nghiệp công;
- Lưu: VT..

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Xuân Sinh