

Số: /TB-KT

Trường Tân, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v làm đất, xử lý hạt giống, chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên mạ vụ Mùa

Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào sản xuất vụ Mùa. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại ngay từ giai đoạn đầu vụ.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo và đề nghị các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các thôn và toàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ:

- Thu dọn tàn dư cây trồng, cỏ dại trên bờ ruộng, kênh mương; không để lúa chết, lúa tái sinh trên đồng ruộng.
- Thực hiện cày lật gốc rạ, cày ải, phơi đất, bừa kỹ trước khi gieo cấy nhằm tiêu diệt nguồn sâu bệnh tồn dư, hạn chế phát sinh dịch hại đầu vụ.
- Xử lý rơm rạ bằng các loại chế phẩm vi sinh như: **PHR, chế phẩm sinh học R1, Sumitri...**, hạn chế hiện tượng nghẹt rễ sau cấy.

2. Xử lý hạt giống trước khi gieo cấy hoặc sau khi ngâm ủ hạt giống đã nảy mầm bằng một trong các loại thuốc: *Cruiser Plus 312.5FS, Kola 600FS, Gaucho 600FS*, ...giúp hạn chế rầy môi giới truyền bệnh virus, tăng tỷ lệ nảy mầm, nâng cao sức sinh trưởng và khả năng chống chịu của cây mạ.

3. Chăm sóc mạ

- Mạ trên nền đất cứng: luôn đảm bảo đủ ẩm. Chú ý: mở rơm rạ sau gieo 3- 5 ngày. Nếu để mạ trên 10 ngày hoặc mạ nền cấy chân ruộng vằn thắp để mạ cao cây, dùng Lân Super, hoặc NPK loại 5-10-3 pha loãng với nước bùn tưới dưỡng.
- Mạ được: duy trì mực nước nông, bón thúc sớm khi mạ có 2 lá bằng phân tổng hợp NPK có hàm lượng đạm thấp như: NPK5-10-3.

4. Tăng cường kiểm tra các trà mạ, kịp thời phát hiện và diệt trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen (là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và vàng lá di động):

Khi phát hiện có rầy trên được mạ, các hộ nông dân cần kịp thời phun trừ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lụi.

Sử dụng một trong các loại thuốc như: *Chess 50WG, Dantotsu 16WSG, Oshin 20WP*,....

5. Phòng trừ cỏ dại:

- Đối với lúa cây: sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm: *Butavi 60EC*, *Heco 600EC*,... hoặc hậu nảy mầm sớm: *Vitarai 15WG*, *Sunrice 15WG*, ...theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc.

- Đối với lúa gieo thẳng: sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm: *Sofit 300EC*, *Acofit 300EC*, ...ngay sau gieo theo đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

6. Diệt chuột và ốc bươu vàng:

- Tổ chức diệt chuột, thu gom và tiêu hủy ổ trứng, ốc bươu vàng bằng các biện pháp thủ công, cơ học, sinh học và hóa học.

- Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

(Liều lượng, nồng độ và cách dùng các loại thuốc BVTV theo hướng dẫn ghi trên bao bì)

Vậy, Phòng Kinh tế xã đề nghị các thôn, Giám đốc các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn, chỉ đạo, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Trưởng thôn các thôn;
- Giám đốc các HTX DVNN trên địa bàn xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: KT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Vũ Thị May