ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG VIỆT HOÀ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:3543 /TB-UBND	*Việt Hoà, ngày* 19 *tháng* 11 *năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên Đán

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng, thời tiết vụ Đông Xuân 2026 – 2027 trên địa bàn thành phố có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 9 – 11 đợt không khí lạnh tăng cường từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027. Trọng tâm từ cuối tháng 12/2026 đến tháng 02/2027 (giai đoạn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán), khu vực có khả năng xuất hiện 1 – 2 đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày kèm theo mưa phùn, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 – 13°C, vùng ven biển và hải đảo có thể xuống dưới 11°C kèm gió mạnh, rét buốt. Kiểu thời tiết bất lợi này làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan. Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật tăng đột biến, kéo theo nhu cầu tái đàn lớn sau Tết, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục...).

Căn cứ Công văn số 05/HD-BQLRKN ngày 18/11/2026 của Ban Quản lý rừng và Khuyến nông thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên Đán.

Để chủ động bảo vệ an toàn sản xuất chăn nuôi, UBND phường Việt Hòa thông báo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2027 như sau:

1. Kỹ thuật củng cố, vệ sinh chuồng trại và sưởi ấm cho vật nuôi

- Gia cố, che chắn chuồng trại: Kiểm tra, tu sửa mái chuồng đảm bảo không bị dột ướt; sử dụng bạt, cót, phên nứa che chắn kín xung quanh để ngăn mưa tạt, gió lùa nhưng vẫn phải đảm bảo độ thông thoáng, tránh tích tụ khí độc (NH3, H2S) trong chuồng.

- Giữ nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ; rải thêm chất độn chuồng (trấu, phoi bào, mùn cưa, rơm rạ khô đã được khử trùng, phơi khô) dày từ 10 – 15 cm để giữ ấm, tuyệt đối không để vật nuôi nằm trực tiếp trên nền xi măng lạnh, ẩm ướt.

- Bố trí hàng rào ngăn cách và hố sát trùng tại cổng ra vào khu vực chăn nuôi. Đối với chuồng nuôi đã xuất bán hết, phải tiến hành cọ rửa sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng 2 tối thiểu 7 ngày trước khi nhập đàn mới (nếu có điều kiện, các trang trại nên để trống chuồng 10 – 15 ngày để nền chuồng khô hoàn toàn).

- Sưởi ấm cho vật nuôi: Áp dụng các biện pháp sưởi ấm phù hợp theo từng đối tượng vật nuôi:

+ Đối với gia cầm non: Sử dụng quây úm kết hợp bóng đèn hồng ngoại hoặc lò sưởi chuyên dụng (đèn treo cách mặt nền 50 – 60 cm, mật độ 60 – 100 con/bóng tùy theo mùa). Duy trì nhiệt độ úm khoảng 33°C lúc mới nở và giảm dần xuống 23°C khi được 4 tuần tuổi. Thường xuyên quan sát phản ứng của đàn vật nuôi để điều chỉnh nhiệt độ (nếu vật nuôi tụm lại gần nguồn nhiệt, ăn kém là thiếu nhiệt; tản xa nguồn nhiệt, há miệng thở là thừa nhiệt; đi lại nhanh nhẹn, ăn uống bình thường là nhiệt thích hợp).

+ Đối với lợn: Sử dụng bóng sưởi, tấm sưởi cho lợn con theo mẹ (mật độ úm khoảng 12 lợn con/ô chuồng sàn diện tích 3,5 – 4 m^2). Đối với lợn nái, duy trì nhiệt độ chuồng nuôi ổn định ở mức 20°C – 25°C để đảm bảo khả năng tiêu hóa, hấp thu và tiết sữa nuôi con.

+ Đối với trâu, bò: Dự trữ củi, trấu, lá khô để đốt lửa sưởi ấm trong những ngày rét đậm, rét hại (có thể kết hợp đốt quả bồ kết để khói bồ kết giúp chống suy hô hấp và thông đại tiểu tiện cho trâu, bò). Lưu ý đặt bếp sưởi ở vị trí an toàn, có ống dẫn khói ra ngoài chuồng để tránh ngạt khí độc hoặc gây hỏa hoạn. Sử dụng bao tải, vải bạt may áo ấm khoác cho trâu, bò.

2. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng nâng cao sức đề kháng

- Đối với đàn trâu, bò:

+ Cung cấp đủ thức ăn thô xanh với định mức bình quân 5 – 7 kg/con/ngày từ nguồn rơm khô dự trữ, cỏ trồng (VA06, Mulato...) và tận thu phụ phẩm nông nghiệp (thân lá ngô, ngọn mía, dây khoai lang...) đem phơi khô hoặc ủ chua. Bổ sung thức ăn rơm ủ urê theo công thức an toàn: 100 kg rơm khô + 2,5 kg urê + 0,5 kg vôi bột + 0,5 kg muối ăn + 70 – 80 lít nước sạch (ủ kín 7 – 10 ngày trước khi cho ăn).

+ Tăng cường thức ăn tinh (ngô, cám gạo, thức ăn hỗn hợp), khoáng chất, vitamin và treo tảng đá liếm để cân đối dinh dưỡng. Chia làm nhiều bữa ăn trong ngày, trộn lẫn thức ăn tinh với thức ăn thô xanh để tránh chướng hơi dạ cỏ.

+ Cho trâu, bò uống đủ nước sạch, ấm (pha thêm muối ăn với lượng khoảng 5g/100 kg thể trọng/ngày).

- Đối với đàn lợn và gia cầm:

+ Cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân đối tỷ lệ đạm thô theo từng giai đoạn sinh trưởng (lợn con 18 – 20%, lợn thịt 14 – 18%, lợn hậu bị và nái chửa 3 13 – 15%, lợn nái nuôi con 15 – 16%; gà lông màu 0 – 3 tuần tuổi 21 – 22%, giai đoạn 4 tuần đến xuất bán 17 – 19%). Tuyệt đối không sử dụng thức ăn bị ẩm mốc, biến chất hoặc chứa chất cấm.

+ Cho vật nuôi uống nước sạch, ấm và uống tự do theo nhu cầu. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, vật nuôi mới nhập hoặc sau cai sữa, cần bổ sung trực tiếp men tiêu hóa, chất điện giải và Vitamin C pha vào nước uống hoặc trộn thức ăn liên tục từ 3 – 5 ngày theo liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng cường sức đề kháng, chống stress.

- Chế độ chăn thả: Khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C cần hạn chế chăn thả; khi nhiệt độ xuống dưới 12°C (rét đậm, rét hại), tuyệt đối nhốt hoàn toàn gia súc, gia cầm tại chuồng, đặc biệt là gia cầm giai đoạn úm, lợn con theo mẹ và bê, nghé đang bú sữa. Những ngày thời tiết nắng ấm, thực hiện thả muộn và đưa vật nuôi về chuồng sớm hơn thường lệ.

3. Biện pháp phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát tái đàn

- Chủ động tiêm phòng vắc xin: Các hộ chăn nuôi rà soát, tiêm phòng bổ sung đầy đủ các loại vắc xin theo quy định của cơ quan thú y (Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng cho trâu, bò; Dịch tả lợn cổ điển, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng cho lợn; Cúm gia cầm, Newcastle cho gà; Cúm gia cầm, Dịch tả vịt cho thủy cầm…) và tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh nguy hiểm được cơ quan thú y khuyến cáo tiêm định kỳ theo quy trình kỹ thuật (Tai xanh, Đóng dấu, Phó thương hàn, Circovirus, E.coli cho lợn; Gumboro, Viêm phế quản truyền nhiễm cho gia cầm; bệnh Dại cho chó, mèo…).

- Vệ sinh an toàn sinh học: Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn VietGAHP, thực hiện nghiêm 3 nguyên tắc cốt lõi (Cách ly – Vệ sinh – Tiêu độc, khử trùng):

+ Cách ly nghiêm ngặt: Có hàng rào bao quanh, lưới chống côn trùng và động vật trung gian truyền bệnh; hạn chế tối đa người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, bắt buộc thay bảo hộ lao động và đi qua hố sát trùng tại cổng.

+ Vệ sinh sạch sẽ và xử lý chất thải: Quét dọn, thu gom chất thải hằng ngày; bố trí hệ thống xử lý chất thải (hầm Biogas, đệm lót sinh học, hố ủ phân...), tuyệt đối không xả thải trực tiếp ra môi trường, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng nuôi.

+ Tiêu độc, khử trùng định kỳ: Phun thuốc sát trùng (Vikol, Benkocid, Haniodine...) hoặc rắc vôi bột toàn bộ chuồng trại, dụng cụ và khu vực xung quanh tối thiểu 2 tuần/lần (nơi không có dịch) và 1 lần/tuần (nơi có nguy cơ cao).

- Kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn và vận chuyển: Con giống nhập về phải có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng đầy đủ, có giấy chứng nhận kiểm 4 dịch của cơ quan thú y (khi vận chuyển ngoại tỉnh) và phải nuôi cách ly tối thiểu 14 ngày trước khi nhập chung với đàn hiện có.

- Đối với các cơ sở từng xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi: Chỉ được phép tái đàn khi đã qua 30 ngày kể từ khi công bố hết dịch, đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn sinh học và phải nuôi thăm dò với số lượng nhỏ (sau 30 ngày lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính mới được tái đàn đủ quy mô). Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học khuyến cáo chuyển đổi sang nuôi đối tượng vật nuôi khác.

- Hạn chế vận chuyển vật nuôi vào những ngày rét đậm, rét hại; tuyệt đối không mua bán, vận chuyển vật nuôi bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường (bỏ ăn, sốt, ho, thở khò khè, chết không rõ nguyên nhân...) phải tách riêng để theo dõi và báo ngay cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ

sở để xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu dịch, bán chạy vật nuôi bệnh hay vứt xác động vật bừa bãi ra môi trường.

Khi phát hiện các trường hợp bất thường xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản liên hệ cán bộ phụ trách chăn nuôi, thú y, thủy sản của phường (đồng chí Nguyễn Ngọc Thuý, SĐT liên hệ 0838430951) để được hướng dẫn các biện pháp khắc phục kịp thời.

Trên đây là thông báo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2027 của UBND phường Việt Hòa./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- TT sự nghiệp DVC phường (để tuyên truyền);
- Tổ Trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT; XDNNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG VIỆT HÒA T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Thành Hải