

Số: /TB-UBND

Việt Hoà, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa vụ Chiêm năm 2026

Căn cứ Công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 08/4/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025-2026.

Căn cứ Thông báo số 06/TB-TTTVHD ngày 09/4/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương về tình hình sâu bệnh trên cây lúa Xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới.

Hiện nay trên địa bàn phường Việt Hoà, lúa đang giai đoạn từ cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng và trên đòng ruộng đang xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh gây hại có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất lúa.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia: Từ nay đến đầu tháng 5/2026 có thể sẽ xuất hiện mưa rào, có những ngày ẩm độ không khí cao, thời tiết nắng mưa xen kẽ, trời âm u. Đây là điều kiện thuận lợi để sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn (đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông) phát sinh phát triển, gây hại gia tăng trên đòng ruộng và gây hại trực tiếp bộ lá đòng; sẽ có diện tích bị lúa sâu cuốn lá nhỏ gây hại trắng lá, bệnh đạo ôn lá gây “lụi lúa” và bệnh đạo ôn cổ bông gây bông bạc ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phun phòng trừ, kịp thời, hiệu quả.

Để bảo vệ năng suất và sản lượng lúa vụ Chiêm năm 2026, UBND phường Việt Hoà thông báo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông vụ Chiêm năm 2026 như sau:

1. Về phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 vụ Chiêm năm 2026

- Chỉ phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên trên những diện tích lúa làm đòng và 50 con/m² trở lên đối với lúa đẻ nhánh.

- Thời điểm phun trừ sâu cuốn lá nhỏ đối với những diện tích lúa phải phun trừ: **Từ 15/4-18/4/2026** (tùy theo sinh trưởng của lúa Chiêm, đảm bảo đúng thời điểm sâu non tuổi nhỏ).

- Một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu cuốn lá nhỏ hiệu quả hiện nay: Dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr như thuốc

Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC,... hỗn hợp với thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate như Rholam super 50SG,....

- Những diện tích lúa có mật độ sâu non cao (hàng trăm con/m²) phải phun kép lần 2 sau lần phun 1 từ 4-5 ngày.

- Những diện tích lúa sau phun thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ.

- Nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát.

2. Về phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa Chiêm năm 2026

- Tiếp tục phòng, trừ chuột hại cho lúa vụ Chiêm năm 2026. Nghiêm cấm diệt chuột bằng điện dưới mọi hình thức.

- Bệnh đạo ôn:

+ Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục kiểm tra và phun trừ bệnh trên những giống lúa nhiễm bệnh khi thấy bệnh xuất hiện với tỷ lệ 5-10% số lá trở lên.

+ Bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié: Tiến hành phun phòng chống bệnh trên giống nhiễm khi lúa thấp tho trở bằng một số loại thuốc đặc trị như: Filia 525SE, Beam 75WP, Fujione 40EC, Ninja 35EC, ...

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Dùng thuốc Lobo 8WP; Starner 20WP; Ychatot 900SP; Kasumin 2L; Totan 200WP, Xanthomix 20WP... phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc phun phòng trước và sau các đợt mưa giông, bão đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng hầu đặc biệt những ruộng đã bị nhiễm bệnh giai đoạn trước.

- Phun trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên những diện tích có mật độ rầy từ 1.000 con/m² (đối với lúa đã trở) và từ 2.000 con/m² (đối với lúa chưa trở), giữ mực nước ở ruộng từ 3-5 cm và dùng thuốc tùy theo giai đoạn lúa. Đối với lúa đang làm đòng đến trở bông: Dùng các loại thuốc lưu dẫn như: Chess 50WG, Apta 300WP, Suintin 5EC,... phun trừ. Đối với lúa chắc xanh phải rẽ lúa thành từng luống rộng 0,8-1m, dùng các loại thuốc tiếp xúc: Apta 300WP, Bassa 50EC... phun trực tiếp vào rầy.

- Phun trừ bệnh lem lép hạt: Dùng thuốc Tilsuper 300ND; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng trừ khi lúa thấp tho trở.

- Sâu đục thân: Khi phát hiện mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m² dùng thuốc Prevathon 5SC; Voliam – Targo 063SC; Sunset 150SC;... phun trừ khi lúa thấp tho trở.

- Bệnh khô vằn: Dùng thuốc Tilsuper 300ND; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng trừ.

* Lưu ý: Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ chai, gói thuốc; khuyến cáo nông dân phun thuốc khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2); thời điểm phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát, phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất

thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ; thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường.

Trên đây là thông báo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa vụ Chiêm năm 2026 của UBND phường Việt Hòa. UBND phường giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường phát tin tuyên truyền đến các hộ nông dân để các hộ nắm được thực hiện thăm đồng và phòng, trừ sâu, bệnh trên lúa Mùa kịp thời; giao các Hợp tác xã DVNN trên địa bàn phường điều tiết nước phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, hướng dẫn các hộ nông dân phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- TT VHNTTT phường (để tuyên truyền);
- Các HTX DVNN;
- Lưu: VT; KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Hải