

Số: /TB-UBND

Việt Hòa, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa và kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ

Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-TTTVHD ngày 23/6/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng (OBV) hại lúa và Hướng dẫn số 12/HD-TTTVHD ngày 23/6/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ.

Hiện nay trên địa bàn phường Việt Hòa các hộ nông dân đang tiến hành làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Mùa năm 2026. UBND phường Việt Hòa thông báo hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa và kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn phường Việt Hòa như sau:

1. Một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa

1.1. Biện pháp thủ công

- Bắt ốc và thu gom ổ trứng bằng tay: Nên bắt ốc sớm và liên tục, bắt lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Đặt lưới mắt cáo bằng kim loại, bằng lưới nylon hay bằng tre nứa ở chỗ dẫn nước để ngăn chặn ốc lây lan, đồng thời cũng dễ thu gom.
- Vét rãnh trên ruộng để khi tháo nước, rút nước trong ruộng nhằm tập trung ốc ở rãnh để bắt hoặc phun thuốc.
- Phát động chiến dịch tiêu diệt ốc bươu vàng, bắt ốc và thu gom ổ trứng đem tiêu hủy.
- Điều tiết chế độ nước bằng cách rút nước định kỳ, giữ mực nước thấp 2-3 cm nhằm hạn chế ốc di chuyển, phá hại.

1.2. Biện pháp dẫn dụ sinh học

- Dùng một số loại thức ăn ưa thích như: Dây lá khoai lang, lá khoai sọ, lá đu đủ, lá chuối, sơ mít bó thành mớ thả xuống nước dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến bám xung quanh rồi thu bắt.
- Dựa vào đặc tính ẩn nấp ban ngày của ốc bươu vàng, cắt cỏ xanh đem đắp thành mô nhỏ khắp ruộng. Chiều mát thu gom ốc bươu vàng tiêu hủy, làm liên tục trong nhiều ngày.
- Khi ốc bươu vàng sinh sản có thể cắm nhiều cọc dọc theo bờ ruộng để thu hút ốc đến đẻ trứng và diệt trừ các ổ trứng.

1.3. Biện pháp hóa học

Tiến hành phòng trừ khi mật độ ốc bươu vàng từ trên 3 con/m² trở lên bằng một số loại thuốc: Black Carp 750WP, Clopdansuper 700WP, Dioto 830WG, Amani 70WP, Transit 750WP, VT-dax 700WP, Tomahawk 4GR...

- Với lúa sạ: Trước khi sạ vài ngày, bà con dẫn nước xâm xấp vào ruộng để nhử ốc bươu vàng rồi lên; sau đó tiến hành phun thuốc rồi mới sạ lúa; phun một trong các loại thuốc hóa học trừ ốc bươu vàng cho lúa với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì thuốc.

- Với lúa cấy: Trước khi cấy hoặc ngay sau khi cấy tháo cạn xâm xấp nước phun thuốc diệt ốc cho lúa, sau 24 giờ phun thuốc mới cho thêm nước để cấy hay dưỡng lúa.

Lưu ý: Sau khi phun (rải) thuốc phải giữ mực nước trong ruộng từ 3-5 cm trong thời gian từ 5-7 ngày; không để nước rò rỉ xuống khu vực nuôi trồng thủy sản; nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hay chiều mát là lúc ốc bươu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng hiệu quả của thuốc. Đặc biệt, không phối trộn cùng thuốc trừ cỏ lúa và trừ ốc bươu vàng. Các loại thuốc trừ ốc thường có độ độc cao ảnh hưởng trực tiếp đến các loại động vật thủy sinh và nguồn nước sinh hoạt vì vậy cần ưu tiên sử dụng biện pháp thủ công để phòng trừ ốc, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học.

2. Một số biện pháp kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ

2.1. Đối với lúa gieo thẳng, gieo vãi

- Giống lúa: Chọn giống ngắn ngày, lúa chất lượng cao, ngâm ủ phải đúng kỹ thuật, hạt vừa mới nảy mầm gieo là tốt nhất.

- Công tác làm đất: Bón lót đủ các loại phân như hướng dẫn, sau đó làm nhuyễn đất nhằm trộn đều giữa đất và phân đã bón, san phẳng ruộng, lên luống, làm phẳng mặt luống. Sau khi làm đất xong phải tiến hành gieo ngay, gieo thưa vừa phải, không gieo quá dày lãng phí giống.

- Sử dụng thuốc trừ cỏ cho lúa gieo thẳng, gieo vãi đúng kỹ thuật; nên sử dụng những loại thuốc có chất an toàn như: Butoxim 60EC; Sofit 300EC; Prefit 300EC; Chani 300EC ...; Nhóm thuốc này có thể trừ được tất cả các loại cỏ trên ruộng lúa, sau khi chọn thuốc nên phun ngay sau gieo, thời gian phun thuốc từ 1-6 ngày (phun theo hướng dẫn trên bao bì), sau khi gieo phải giữ nước hợp lý. Chỗ ruộng cao gheñh khả năng nhiều cỏ thì sử dụng liều 50ml, nơi ruộng thấp trũng khả năng ít cỏ có thể sử dụng liều thấp 40ml. Nếu đất làm trước, trước khi gieo phải trang lại ruộng, rồi mới gieo hạt, sau khi gieo nên tháo cạn nước, sử dụng thuốc trừ cỏ, duy trì mực nước sâm sấp trên ruộng.

2.2. Đối với lúa cấy:

Thuốc trừ cỏ cho lúa cấy bà con nên sử dụng tập trung vào 3 nhóm chính:

a. Nhóm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm:

- Gồm có các loại thuốc như: Butavi 60EC; Butoxim 60EC; Butan 60EC; Echo 60EC; Heco 60EC; ...; Thời gian phun thuốc: 3 - 7 ngày sau cấy, liều lượng; 40 - 50ml/ sào, trừ được tất cả các loại cỏ;

- Gồm các loại thuốc: Acenidax 17WP, Beto 14WP, Arorax 17WP... Thuốc có hiệu quả cao với các loại cỏ, thời gian rắc thuốc sau cấy từ: 3 - 7 ngày, liều lượng dùng từ: 15 - 20gr thuốc/sào. Thuốc được trộn đều với đất bột, đạm hoặc lân... (không pha với nước để phun, khi rắc thuốc lá lúa phải khô, nước không ngập cây, không dùng cho lúa gieo, mạ non) sẽ gây chết, chột ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây lúa.

b. Nhóm thuốc trừ cỏ hỗn hợp:

Gồm các loại thuốc như: Fitri 18,5WP, Gradf 200WP, Ansius 10WP; Huyết rồng 10WPG; Sirius 10WP; Star 10WP; ...; Thuốc trừ được các loại cỏ. Thời gian sử dụng sau gieo, cấy từ: 3 – 10 ngày. Thuốc có thể với nước để phun hoặc trộn với đạm, lân, đất bột để rắc. Liều lượng phun theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi phun thuốc đất phải đủ ẩm hoặc rắc thuốc ruộng phải có một lớp nước mỏng từ: (0,5 - 1Cm).

c. Nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm:

- Gồm các loại thuốc như; Sunrice 15WDG, Run life 15WDG, Sun- raise nongphat 15 WDG. Thuốc có hiệu quả trừ cỏ lá rộng như; cỏ bọ, cỏ vẩy ốc. cỏ dứa cạn, cỏ chác, lác...; Thời gian phun hoặc rắc thuốc ở vụ mùa sau khi gieo hoặc cấy từ: 10 - 20 ngày. Liều lượng; 3 - 4gr thuốc. Thuốc có thể pha với nước phun hoặc trộn với cát rắc đều cho một sào.

Lưu ý: - Nếu làm đất xong chưa gieo cấy được (do thời tiết), trước khi gieo cấy phải trang lại mặt ruộng; khi sử dụng thuốc trừ cỏ, không được để nước to, chỉ sâm sấp là đủ; sau khi tĩa dặm phải giữ nước đủ nước, không để ruộng nứt nẻ, cỏ sẽ mọc trở lại.

Trên đây thông báo hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa và kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ của UBND phường Việt Hòa./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường (để tuyên truyền);
- Các HTX DVNN;
- Tổ Trưởng các tổ dân phố
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Hải

