

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH AM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTĐVSNC
V/v phòng trừ sâu bệnh hại
trên cây vụ Đông 2025

Vĩnh Am, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: - Các ngành, đơn vị liên quan;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hoá - xã hội;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các thôn trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn xã, việc thu hoạch lúa Xuân về cơ bản thực hiện xong, đồng thời chuyển trọng tâm sang chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông. Qua kiểm tra, thăm đồng ngày 13/11/2025 cho thấy, các loại cây trồng vụ Đông đang sinh trưởng, phát triển tương đối tốt.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, ban ngày trời nắng, độ ẩm thấp, ban đêm nhiệt độ hạ thấp kèm có sương. Đây là điều kiện thuận lợi để sâu, bệnh phát sinh và gây hại trên các loại cây vụ Đông. Sau đây là một số sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây trồng vụ Đông:

1. Sâu bệnh hại trên cây ớt:

1.1. Bệnh đốm lá

- Bệnh do nấm gây ra và có khả năng lây lan nhanh.
- Tiến hành ngắt bỏ lá bệnh đem tiêu hủy (vì bào tử sẽ hình thành trên nấm bệnh sau 5 - 7 ngày). Ngừng sử dụng các chất kích thích sinh trưởng hoặc phân bón qua lá khi cây có dấu hiệu bệnh. Sau khi cây đã hồi phục mới tiếp tục chăm bón.
- Sử dụng một trong các loại thuốc như: Saizole, Sagograin, Mexyl MZ,... Bệnh nặng phun 5 - 7 ngày/lần.

1.2. Rầy rệp, bọ phấn, bọ trĩ

Chúng chích hút nhựa cây và tiết bã nhờn nấm bệnh xâm nhập tạo thành lớp màng làm giảm khả năng quang hợp, mật độ cao gây chết đen ngọn. Dùng các loại thuốc như Oshin, Cyosuper, Chess, Chessin,...

1.3. Nhện

- Nhện chích hút dịch làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ, phòng rệp. Khi mật độ cao làm cho lá khô cháy.
- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Ortus 5SC, Agrovertin 50EC,...

2. Sâu bệnh hại trên cây ngô:

2.1. Sâu đục thân ngô

Sâu gây hại giai đoạn ngô mới trồng đục vào thân gây chết cây, khuyết mật độ. Sâu thường gây hại nặng vào thời điểm ngô xoắn nõn, phun râu đục vào bắp ảnh hưởng đến chất lượng bắp. Để phòng trừ tốt sâu đục thân ngô cần dùng các thuốc như: Virtako, VoliamTango, DuponTMPrevathon,....

Phun giai đoạn ngô phun râu, thâm râu sẽ có hiệu quả cao với đối tượng này.

2.2. Bệnh gỉ sắt, đốm lá ngô

- Bệnh đốm lá ngô: Bệnh gây hại làm lá bị đốm vàng, gây hại các lá phía dưới làm lá bị khô, cây còi cọc, kém phát triển.

- Bệnh gỉ sắt ngô: Bệnh gây hại làm cây ngô sinh trưởng kém, giảm khả năng quang hợp (*do lá bị vàng, nổi u sần*). Cần kiểm tra, phun trừ ngay khi bệnh chớm xuất hiện, khi bệnh dùng cần tăng cường chăm bón cho cây. (*Lưu ý giống nhiễm như HN88*).

Dùng các thuốc như: Nativo, Amistatop, Anvil,... cần phun từ 30-36 lít nước thuốc/sào.

3. Đối với cây rau họ thập tự

3.1. Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhậy gây hại trên rau thập tự

Chủ động kiểm tra để phát hiện các đối tượng sinh vật hại như: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhậy...) trên rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ, các loại cải,...).

Sử dụng các loại thuốc được dùng cho rau như: Incipio 100 DC, Oshin, Clever, Radiant....thời gian cách ly 7-14 ngày.

Ngoài ra còn một số đối tượng khác như: bệnh giả sương mai, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh phấn trắng, sâu đục quả gây hại các cây họ cà, dưa chuột, bầu bí,... Vì vậy, nhân dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm và phun trừ kịp thời.

*** Lưu ý:**

- *Trước khi trồng nên xử lý đất bằng vôi bột để hạn chế mầm bệnh;*
- *Phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ kịp thời;*
- *Đảm bảo thời gian cách ly sau phun từ 7-14 ngày.*

Trên đây là nội dung hướng dẫn về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây vụ Đông. Để đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt và hạn chế thiệt hại, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ông (bà) Trưởng thôn; Đài truyền thanh; các ban ngành đoàn thể từ xã tới các thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng Trung tâm dịch

vụ sự nghiệp công tuyên truyền, vận động, đôn đốc để các hộ trồng thực hiện tốt nội dung hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đảng ủy xã (bc);
- Lưu VT, VHXX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Thành