

Số: /TB-UBND

Yết Kiêu, ngày tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc tập trung phun phòng trừ bệnh đạo ôn và diệt trừ chuột gây hại lúa vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026

- Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Các HTX dịch vụ nông nghiệp, các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Căn cứ Thông báo số 04/TB-TTTVTL ngày 16/3/2026 của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tứ Lộc về việc tăng cường kiểm tra, phòng trừ bệnh đạo ôn, chăm sóc lúa xuân 2026.

Hiện nay, trà lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Thời tiết thời gian qua chủ yếu trời ẩm, ẩm, độ ẩm không khí trung bình cao (80 - 95%), nhiệt độ từ 17-22°C là điều kiện rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá.

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy: bệnh đạo ôn lá đang phát sinh gây hại trên các giống lúa nhiễm như Nếp, BC15, TBR225, J02... với tỷ lệ bệnh trung bình 1-2%, nơi cao từ 7-10%.

Dự báo thời gian tới, nếu thời tiết âm u, mưa phùn và độ ẩm cao thì nguy cơ bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục gây hại và bùng phát, lây lan diện rộng nếu không phun phòng trừ kịp thời.

Bên cạnh đó, trên một số diện tích lúa còn xuất hiện hiện tượng khô tấp đầu lá, nguyên nhân chủ yếu do bón phân chưa cân đối, bón thừa đạm kết hợp với điều kiện thời tiết trời lạnh, khô và có gió làm phần đầu lá bị cháy khô. Đây không phải là bệnh đạo ôn, bà con cần chú ý phân biệt để tránh nhầm lẫn và phun thuốc phòng trừ bệnh không cần thiết.

Để chủ động bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, các HTX Dịch vụ Nông nghiệp, các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ bệnh, chuột phá hoại lúa Đông Xuân như sau:

**1. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phun phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn**

- Các hộ nông dân cần tăng cường thăm đồng, kiểm tra kỹ diện tích lúa của gia đình, đặc biệt chú trọng trên các giống lúa nhiễm như: (Nếp, TBR225, BC15, J02...).

- Phun ngay khi phát hiện vết bệnh đầu tiên: Khi bệnh mới xuất hiện, vết bệnh là những chấm nhỏ màu xanh xám hoặc nâu nhạt. Khi bệnh phát triển, vết bệnh kéo dài hình thoi rõ rệt (hình mắt én), giữa vết bệnh có màu xám trắng hoặc xám tro, viền vết có màu nâu sẫm hoặc nâu đỏ. Khi bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết làm cháy cả lá, cây lùn lại, phát triển chậm, giảm số nhánh hữu hiệu, nếu không phun trừ kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất.

## **2. Biện pháp phòng trừ:**

- Thời điểm phun: Khi thấy bệnh chớm xuất hiện (tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%) cần tiến hành phun trừ ngay.

- Loại thuốc sử dụng: Sử dụng một trong các loại thuốc như: *Filia 525SE*, *Fuji-one 40WP*, *Katana 20SC*, *Bankan 600WP*....

### **Lưu ý kỹ thuật:**

- + Phun ướt đều tán lá, tập trung phần lá phía trên.
- + Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh nắng gắt hoặc trước mưa.
- + Đối với những diện tích bị nhiễm bệnh nặng, cần phun lại lần 2 sau lần thứ nhất từ 3-5 ngày. Nồng độ thuốc phun theo hướng dẫn in trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 -18 lít/sào.

Khi bệnh chưa có dấu hiệu dừng, tuyệt đối không được bón đạm hoặc phun các loại phân bón lá có chứa đạm, để tránh bệnh bùng phát nặng hơn. Chỉ khi nào vết bệnh đã khô và dừng phát triển thì mới có thể tiếp tục chăm sóc bình thường theo quy trình kỹ thuật.

- + Không bón thừa đạm khi ruộng đã có bệnh vì sẽ làm bệnh phát triển mạnh.
- + Tăng kali và silic (nếu có) để tăng sức chống chịu.
- + Điều tiết nước hợp lý, tránh ruộng quá rậm rạp, ẩm độ cao. Trên các giống nhiễm nếu ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm và gặp thời tiết âm u ẩm kéo dài thì bệnh có thể bùng phát rất nhanh chỉ trong 3-5 ngày, vì vậy việc phát hiện sớm và phun sớm là yếu tố quyết định.

## **3. Đối với những diện tích lúa có hiện tượng vàng lá, nghệt rễ, ngộ độc hữu cơ:**

- Tiến hành tháo cạn nước, phơi ruộng khoảng 2- 3 ngày để giải phóng khí độc, sau đó đưa nước mới vào và bón 10kg supelaan/sào hoặc sử dụng các chế phẩm phân bón lá siêu lân, Antonic, K-Humic, ET, Comcat... phun từ 2- 3 lần, cách nhau 3-5 ngày/lần nhằm kích thích bộ rễ lúa phát triển. - Trong thời gian cây lúa đang bị ảnh hưởng không bón thúc phân đạm Ure, phân NPK nhất là phân chứa hàm lượng đạm cao. Khi kiểm tra thấy cây lúa đã hồi phục như ra

nhều rễ trắng, lá nõn phát triển mới tiến hành bón thúc bổ sung theo đúng quy trình kỹ thuật.

#### **4. An toàn và vệ sinh:**

Khi phun thuốc, bà con cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, đảm bảo thời gian cách ly theo quy định và tuyệt đối không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi ra đồng ruộng, phải thu gom về đúng nơi quy định của địa phương.

*Chú ý : Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại.*

**5. Về việc diệt trừ chuột phá hoại:** Hiện nay trên đồng ruộng chuột vẫn đang cắn phá mạnh trên diện tích lúa, rau màu vụ Đông Xuân, đề nghị các HTX dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn đôn đốc các đơn vị đánh bắt thuê, và các hộ dân tiếp tục tổ chức đánh bắt chuột đồng loạt, bằng mọi biện pháp ở tất cả các khu đồng, khu dân cư, gò đồng, khu chuyển đổi, khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng thuốc hóa học... Tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân xã về việc phòng trừ bệnh đạo ôn vụ, diệt trừ chuột phá hoại lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 trên địa bàn xã. UBND xã đề nghị các HTX dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và nhân dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng và thực hiện tốt các nội dung thông báo trên./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Trạm trồng trọt và BVTV Tứ Lộc;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Thanh Bình**